



Антибиотики после замены сустава

Предосторожность, которую надо соблюдать на протяжении всей жизни

После замены сустава вам надо будет принимать антибиотики с целью профилактики (предотвращения) каждый раз, когда вам делают процедуру, в связи с которой в кровь могут попасть бактерии.

Звоните в Центр хирургии костей и суставов по телефону 206-598-4288, если вы не уверены, надо ли вам принимать антибиотики до процедуры, которую вам будут делать.

Так как вам заменили сустав, вы должны принимать антибиотики перед каждой стоматологической или медицинской процедурой, в связи с которой в кровь могут попасть бактерии. Антибиотики помогут предотвратить инфекцию сустава.


В течение 3 месяцев после операции

Не проходите никакие процедуры, связанные с вашей *дыхательной* системой (воздушными путями и лёгкими), *пищеварительной* системой (*пищеводом*, т.е. каналом, по которому пища проходит вниз, в желудок; желудком и кишечником) или *мочевым трактом* (мочевым пузырём, почками и каналам, по которым проходит моча). После операции по замене сустава вы также должны отложить на 3 месяца любые *элективные* (необязательные) стоматологические процедуры. Единственное исключение – если процедура необходима в связи с критическим состоянием или для лечения инфекции.

Стоматологическое обслуживание

Мы рекомендуем принять антибиотик, прежде чем получать любой вид стоматологического обслуживания, включая даже чистку зубов. Это «предварительное лечение» - предосторожность, которую пациенты после замены сустава должны соблюдать на протяжении всей жизни.

- Если у вас **нет** аллергии на пенициллин, примите 2 грамма сефалексина, сефрадина или амоксициллина перорально за **1 час до** получения любого вида стоматологического обслуживания.
- Если у вас **есть** аллергия на пенициллин, примите 600 миллиграмм клиндамицина за **1 час до** получения любого вида стоматологического обслуживания.



После замены сустава мы рекомендуем принимать дозу антибиотика перед любой стоматологической процедурой.

Эти антибиотики может выписать ваш стоматолог или основной врач. Если у стоматолога возникнут какие-либо вопросы, он(а) должен позвонить в Центр хирургии костей и суставов медицинского центра университета штата Вашингтон (UWMC) по телефону 206-598-4288.

Если у вашего врача есть вопросы

Если у вашего хирурга, семейного врача или стоматолога есть вопросы о профилактическом приеме антибиотиков, попросите их позвонить в Центр хирургии костей и суставов медицинского центра университета штата Вашингтон (UWMC) по телефону 206-598-4288.

У вас есть вопросы?

Ваши вопросы важны. Звоните своему врачу или поставщику медицинского обслуживания, если у вас возникли вопросы или вас беспокоит что-либо. Сотрудники клиники UWMC также могут оказать вам помощь.

В рабочие дни с 8 утра до 5 вечера звоните в Центр хирургии костей и суставов по телефону 206-598-4288.

В нерабочие часы, в выходные и праздничные дни звоните по телефону 206-598-6190 и попросите вызвать дежурного врача-резидента ортопедического отделения.

Процедуры, не связанные со стоматологией

Если вам будут делать процедуру, связанную с дыхательными путями, мочеполовым или пищеварительным трактом, вам скорее всего, понадобится принять антибиотик **до** процедуры, чтобы защитить искусственный сустав.

Позаботьтесь о том, чтобы проводящий процедуру врач знал, что вам сделали замену сустава и что вам нужно принять антибиотик до процедуры. Если у вашего хирурга или основного врача возникнут вопросы по поводу профилактического приема антибиотиков, попросите его/ее позвонить в Центр хирургии костей и суставов UWMC по телефону 206-598-4288.

Процедуры с сопутствующим высоким риском

Ниже указаны некоторые процедуры с сопутствующим высоким риском попадания бактерий в кровь. **Прежде чем вам будет делать любую из этих процедур, очень важно принять антибиотики:**

Дыхательные пути

- Удаление миндалин или аденоидов
- Операция, связанная со слизистыми оболочками дыхательных путей
- Бронхоскопия жестким бронхоскопом

Желудочно-кишечный (пищеварительный) тракт

- Склеротерапия варикозных вен пищевода
- Расширение сужения пищевода
- Эндоскопическая ретроградная холангиография при билиарной непроходимости
- Операция билиарного тракта
- Операция, связанная с кишечником
- Колоноскопия или сигмоидоскопия

Половые и мочевые пути

- Операция предстательной железы
- Цистоскопия
- Расширение просвета уретры

Примечание

Некоторые врачи рекомендуют принимать антибиотики перед процедурами с сопутствующим высоким риском только в течение 2 лет после операции по замене сустава. Однако, Центр хирургии костей и суставов UWMC рекомендует принимать антибиотики с профилактической целью перед процедурами с сопутствующим высоким риском **на протяжении всей жизни.**

Antibiotics After Joint Replacement

A lifelong precaution

After you have had a joint replacement, you will need to take prophylactic (preventive) antibiotics any time you have a procedure that might bring bacteria into your bloodstream.

Call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288 if you have any questions about whether you need to take antibiotics before a procedure you are planning to have.

Now that you have a joint replacement, you must take a dose of antibiotics before any dental or medical procedure or event that might bring bacteria into your bloodstream. Taking antibiotics will help prevent infection in your joint.


For 3 Months After Surgery

Do **not** have any procedures that involve your *respiratory* system (airway and lungs), *digestive* system (*esophagus*, the tube food goes down; stomach; and intestines), or *urinary tract* (bladder, kidneys, and tubes urine goes through). Also, wait 3 months to have *elective* (not required) dental work after your joint replacement surgery. The only exceptions are if you need an emergency procedure or a procedure to treat an infection.

Dental Work

We recommend a dose of antibiotics before any type of dental work, even routine teeth cleaning. This “pre-treatment” is a lifelong precaution for patients with a joint replacement.

- If you are **not** allergic to penicillin, take 2 grams of cephalexin, cephadrine, or amoxicillin by mouth **1 hour before** any dental procedure.
- If you **are** allergic to penicillin, take 600 milligrams of clindamycin **1 hour before** any dental procedure.



After joint replacement, we recommend a dose of antibiotics before you have any type of dental work done.

Your dentist or primary care provider should be able to prescribe these antibiotics for you. If your dentist has any questions, they should call the Bone and Joint Surgery Center at University of Washington Medical Center (UWMC) at 206-598-4288.

If Your Health Care Provider Has Questions

If your surgeon, primary care provider, or dentist has any questions about prophylactic antibiotics, please ask them to call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288 at University of Washington Medical Center (UWMC).

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns. UWMC clinic staff are also available to help.

Weekdays from 8 a.m. to 5 p.m., call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288.

After hours and on weekends and holidays, call 206-598-6190 and ask to have the Orthopaedic Resident on call paged.

Non-Dental Procedures

If you are going to have a procedure that involves the respiratory, digestive, or urinary tract, you will most likely need a dose of antibiotics **before** the procedure to protect your artificial joint.

Make sure that the doctor doing your procedure knows that you have a joint replacement and that you need a dose of antibiotics before your procedure. If your surgeon or primary care provider has any questions about prophylactic antibiotics, have them call UWMC's Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288.

High-Risk Procedures

These are some of the procedures that are high-risk for bringing bacteria into your bloodstream. **It is very important to take antibiotics before having any of these procedures:**

Respiratory Tract

- Tonsillectomy or adenoidectomy
- Surgery that involves respiratory mucous membranes
- Bronchoscopy with a rigid bronchoscope

Gastrointestinal (Digestive) Tract

- Sclerotherapy for esophageal varices
- Esophageal stricture dilation
- Endoscopic retrograde cholangiography with biliary obstruction
- Biliary tract surgery
- Surgery that involves the intestines
- Colonoscopy or sigmoidoscopy

Genital and Urinary Tracts

- Prostate surgery
- Cystoscopy
- Urethral dilation

Note

Some health care providers recommend antibiotics before high-risk procedures for only 2 years after your joint replacement surgery. But, UWMC's Bone and Joint Surgery Center advises taking preventive antibiotics before high-risk procedures **for the rest of your life.**