



질문사항?

귀하의 질문은
중요합니다. 만약
질문이나 걱정되는
점이 있으시면
(퇴원서류에
적혀있는) 담당의사
선생님이나
의료제공자에게
연락하십시오.

클리닉:

전화번호:

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

4-Northeast Nursing Unit

Box 356085

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195

206-598-4422

환자교육

4-Northeast



폐쇄 구형 배농관 관리

잭슨 프렐 배농관(JP) 또는
블레이크 배농관에 관하여

퇴원하실 때 환자분은 아직 배농관을 그대로 지니고
계실 수도 있습니다. 잭슨 프렐(JP)이나 블레이크
자족적 배농장치일 것입니다. 이 책자는 환자분의
담당 의료제공자가 배농관을 빼내기 까지 배농관을
집에서 관리하는 방법을 설명해 드립니다.

© University of Washington Medical Center
Closed Bulb Drain Care
Korean

07/2004 Rev. 01/2010

Translation by UWMC Interpreter Services


Reprints on Health Online: <http://healthonline.washington.edu>

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

배농액 기록표 1

날짜	시간	용량	색깔	냄새

- 마개와 분출구를 요오드 약솜이나 알코올 거즈로 다시 닦으십시오.
- 손으로 배농구가 납작해 지도록 누르십시오. 마개를 다시 분출구에 끼우십시오.
- 계량컵의 측면에서 배농량을 재십시오. 배농액의 양을 배농액 기록표에 적으십시오. 만일 배농관이 한개 이상이면 1 과 2 로 표시하십시오.
- 배농액의 색깔과 냄새를 확인 하십시오. 악취가 나면 담당 클리닉이나 당직 의사에게 전화하십시오.
- 배농액을 변기에 버리십시오.
- 배농구를 핀이나 집게로 옷에 고정시키십시오.
- 비누와 물로 손을 씻으십시오.



잭슨-프렐 (JP) 폐쇄구형배농관

배농이 나오는 부위를 청결하고 건조하게 유지하십시오. 드레싱을 하루 한 번 바꾸거나 젖을 경우에는 더 자주 바꿔 주십시오.

드레싱을 가는 법

드레싱을 하루에 한번, 또는 젖거나 더러워지면 더 자주 갈으십시오:

- 재료 준비:
 - a) 2 인치 넓이 종이 테이프
 - b) 2 인치나 4 인치 짜리 사각형 가제
- 비누와 물로 손을 씻으십시오.
- 테이프를 뜯어내고 배농관 자리에 있는 드레싱을 제거하십시오. 붉은 기나 악취가 나는지 살피십시오.
- 튜브나 피부에 달라붙어 있는 물질이 있으면 닦아내십시오. 담당 의료제공자에게 어떤 종류의 세제, 젤, 아니면 크림을 써야 하는지 물어보십시오.
- 배농자리가 덮이도록 필요한 만큼의 테이프와 가제를 준비하십시오.
- 포장지를 뜯고 가제 3 개를 꺼내십시오. 가제를 가장자리만 만지십시오. 가제를 각각 반으로 접어 배농 튜브(들)의 양쪽 피부 위에 놓으십시오. 두개의 접은 가제 위에 세번째 가제를 올려 놓으십시오.
- 테이프로 드레싱을 고정시키십시오. 가제가 완전히 가려지도록 테이프를 붙이십시오.

목욕

- 배농관이 있는 동안 목욕을 하거나, 자쿠지를 쓰거나 수영을 하지 마십시오.

- 배농관이 부착된 이후 48 시간이 지나면 샤워를 할 수도 있습니다. 배농관이 빠지는 것을 방지하기 위해서 배농관이 헐렁하게 매달려 있게 하지 마십시오. 한손으로 잡거나 떨어질 염려가 없는 곳에 놓아 두십시오. 샤워하실 때 도움이 필요하실 수도 있습니다.

- 다음과 같은 경우에는 목욕을 하실 수도 있습니다:

- 배농관은 제거되었고 상처는 아물었음.

그리고

- 그 부위에서는 더 이상 새는 것이 없음.

배농관 훑어내기

배농관을 훑어내는 것은 막히는 것을 예방할 것입니다. 담당 의사 선생님이나 간호사가 배농관을 훑으라고 했으면 다음의 순서를 따르십시오:

- 한 손으로, 드레싱 가까이에 있는 튜브를 알코올 가제로 감으십시오.
- 다른 손으로는, 드레싱과 알코올 가제 사이를 꼭 잡아 튜브를 고정시키십시오.
- 첫번째 손으로 알코올 가제로 덮힌 부분을 쥐어짜십시오. 배농구에 까지 닿도록 누른 채로 밀어내린 다음 손을 놓으십시오.

클리닉에 전화해야 할 때

아래와 같은 경우에는 전화하십시오:

- 절개부위나 배농자리가 붉거나 부었을 때.
- 절개부위나 배농자리에서 진물이 샅 때.
- 보통 때 보다 더 아프거나 진통제로 가라앉지 않는 통증이 있을 때.
- 배농구가 압축 상태를 유지하지 못할 때.
- 배농액이 뿌엇거나 악취가 날 때.
- 열이 화씨 101.5 도 (섭씨 38.5 도)보다 높을 때.

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider (listed on your discharge paperwork) if you have questions or concerns.

Clinic:

Phone Number:

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

4-Northeast Nursing Unit

Box 356085

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4422



Closed Bulb Drain Care

*For a Jackson-Pratt (JP) or
Blake drain*


When you go home, you may have drains still in place. You will have a Jackson-Pratt (JP) or Blake self-contained drainage system. This handout explains how to care for your drains at home until your health care provider takes them out.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Record for Drain 1

Day	Time	Amount	Color	Smell

- Then squeeze the bulb flat with your hand. Put the plug back into the spout.
- Look on the side of the measuring cup to see how much fluid you drained. Write this amount on your drainage record sheet. If you have more than one drain, label them 1 and 2.
- Check the drainage for color and smell. If you notice a foul odor, call your clinic or the doctor on call if your clinic is closed.
- Empty the drainage into your toilet.
- Pin or clip the drain bulb back onto your clothing.
- Wash your hands with soap and water.



Jackson-Pratt (JP) closed bulb drain

Keep the area where your drain leaves your body clean and dry. Change your dressing once a day, or more often if it gets wet or dirty.

How to Change Your Dressing

Change your dressing 1 time every day, or more often if your dressing gets wet or dirty:

- Gather supplies:
 - a) 2-inch-wide paper tape
 - b) Gauze pads, either 4-inch or 2-inch squares
- Wash your hands with soap and water.
- Loosen the tape and remove the old dressing from the drain site. Note any redness or foul smell.
- Clean off any dried material that may be around the tube or your skin. Ask your health care provider what type of cleaning solution, gel, or cream to use.
- Prepare the amount of tape and gauze pads you will need to cover your drain site.
- Remove 3 gauze pads from the package. Touch **only** the edges of the gauze. Fold each of the gauze pads in half and place 2 of them on your skin, 1 on each side of the drainage tube(s). Place the third piece of gauze over the 2 folded gauze pads.
- Tape the dressing in place. Completely cover the gauze with tape.

Bathing

- Do **not** take a bath, sit in a hot tub, or go swimming while you have the drain.
- You may shower after you have had the drain in place for 48 hours. To prevent the drainage tube from falling out, do not let the

drain hang loosely. Hold the drain in 1 hand or place it somewhere near you where it will not fall. You may need help in the shower.

- You may take a bath **after**:
 - The drain is removed and your skin has healed.
- and**
- There is no more drainage from the site.

How to Strip Your Drain

Stripping your drain will keep it from clogging. If your doctor or nurse has told you to strip your drain, follow these steps:

- With 1 hand, wrap an alcohol wipe around the tubing near your dressing.
- With your other hand, keep the tubing in place by holding it firmly between your dressing and the alcohol wipe.
- With your first hand, squeeze the section of the tubing covered by the alcohol wipe. Keep this pressure while sliding the wipe down the tubing to the bulb, and then let go.

When to Call the Clinic

Call the clinic if:

- You have redness or swelling at your incision or drain site.
- You have drainage at the incision or drain site.
- You have more pain than usual, or pain that is not eased by your pain medicines.
- Your drain bulb will not stay compressed.
- Your drainage is cloudy or foul-smelling.
- You have a fever higher than 101.5°F (38.5°C).