



Pruebas comunes durante el Trabajo de parto

En este diagrama se incluyen y explican brevemente muchas de las pruebas que puede tener que pasar durante el trabajo de parto y parto. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre las pruebas o los resultados obtenidos en ellas, asegúrese de hablar con su doctor, enfermera, partera u otros miembros del personal de la clínica.

Prueba	¿Qué se prueba?	Información	Comentarios
Determinación del tipo sanguíneo	<i>Sangre</i>	Información útil en caso de emergencia. Ayuda a identificar a las mujeres que necesitan una inyección de Rhogam después del parto.	Transfusión, sólo si se necesita. Si la madre tiene Rh negativo y el bebé es Rh positivo, la madre necesitará una inyección de Rhogam después del parto.
Estreptococos del grupo B (estreptococos Beta)	<i>Resultados verificados de cultivos tomados durante el embarazo</i>	Se podría transmitir la infección al bebé en el parto.	Si hay la presencia de bacterias en la vagina o en la orina, o la madre tiene factores de riesgo (PTL, ROM, etc.), se la tratará con antibióticos. Si la madre tiene resultados positivos, será posible que se tenga que observar al bebé durante uno o dos días después de su nacimiento.

¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Si tiene preguntas o inquietudes, llame a su médico o proveedor de atención a la salud. El personal de la Clínica UWMC está también disponible para ayudarle en cualquier momento.

Trabajo de parto y Parto
206-598-4616

Clínica de Atención
Materno infantil
206-598-4070

Prueba	¿Qué se prueba?	Información	Comentarios
Hematocrito	<i>Sangre (de la madre)</i>	Para detectar un conteo bajo de glóbulos rojos de la sangre (anemia). También se hace después del parto para verificar la pérdida de sangre durante el parto.	Puede necesitar suplementos de hierro después del parto.
Rubéola	<i>Sangre</i>	Muestra tomada a principios del embarazo.	Si el resultado es negativo, se da a la madre una vacuna después del parto.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Maternity and Infant Center
Box 356079
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4616



Common Tests During Labor

This chart lists and briefly explains many of the tests you may have during your labor and birth. Be sure to talk to your doctor, nurse, midwife, or other clinic staff if you have questions or concerns about the tests or your test results.

Test	What's Tested	Information	Comments
Blood type/screen	<i>Blood</i>	Useful information in an emergency. Helps identify women who need Rhogam shot after the birth.	Transfusion only if needed. If mother is Rh negative and baby is Rh positive, the mother needs a Rhogam shot after the birth.
Group B strep (Beta strep)	<i>Results checked of cultures taken during pregnancy</i>	May pass infection to the baby at birth.	If bacteria is present in vagina or urine, or the mother has risk factors (PTL, ROM, etc.), she will be treated with antibiotics. If the mother has tested positive, baby may need to be observed after birth for the first day or two.

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns. UWMC clinic staff are also available to help at any time.

Labor and Delivery:
206-598-4616

**Maternity and Infant
Care Center:**
206-598-4070

Test	What's Tested	Information	Comments
Hematocrit	<i>Blood (from mother)</i>	Checks for low red blood cell count (anemia). Also done after birth to check blood loss during delivery.	May need iron supplements after the birth.
Rubella	<i>Blood</i>	Sample taken earlier in pregnancy.	If test is negative, mother is given vaccination after the birth.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Maternity and Infant Center
Box 356079
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4616