



## ***Giáo Dục Bệnh Nhân***

***Khoa Rọi Hình***



# Phản Ứng Chất Cản Quang

*Thông tin quan trọng về sự phản ứng của quý vị*

**CẢNH BÁO –** Bản tin này cho biết những điều quan trọng về việc nên làm gì nếu quý vị bị phản ứng với chất cản quang, còn được gọi là *thuốc màu chụp quang tuyến X, thuốc màu chụp CT, và chất cản quang MR.*

Quý vị bị phản ứng tương đối hoặc nghiêm trọng vì quá nhạy cảm hoặc phản ứng giống như dị ứng đối với *chất cản quang*, còn được gọi là *thuốc màu chụp quang tuyến X, thuốc màu chụp CT, và chất cản quang MR.*

Chích chất cản quang sau này có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng hơn hoặc thậm chí hiếm khi xảy ra hơn, là tử vong.

### **Vì Sự An Toàn Sau Đây Của Quý Vị**

- Hãy cho (các) bác sĩ, những nơi chăm sóc sức khỏe khác, và bất cứ ai làm hẹn cho quý vị, biết rằng quý vị bị phản ứng với chất cản quang.
- Bị phản ứng không có nghĩa là sau này quý vị sẽ không bao giờ được chích chất cản quang. Nhưng có nghĩa là cần có những biện pháp đề phòng và các sự cân nhắc đặc biệt nếu sau này quý vị có một cuộc thử nghiệm cần sử dụng chất cản quang. Thí dụ như, quý vị sẽ có thể được cho thuốc trước khi thử nghiệm.
- Hãy nghĩ đến việc đeo nữ trang loại cảnh báo y tế. Đeo một sợi dây chuyền hay vòng đeo tay loại cảnh báo y tế để cho các nhân viên cấp cứu biết về trường hợp của quý vị.

### **Có thắc mắc?**

Những thắc mắc của quý vị rất quan trọng. Hãy gọi cho bác sĩ hoặc nơi chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có điều gì thắc mắc hoặc lo ngại.

- Khoa Rọi Hình của UWMC: 206-598-6200
- Khoa Rọi Hình của Harborview: 206-744-3105
- Seattle Cancer Care Alliance: 206-288-7200

**UW Medicine**



**SEATTLE  
CANCER CARE  
ALLIANCE**

**UWMC Imaging Services**

Box 357115

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195  
206-598-6200



# Contrast Reaction

*Important information about your reaction*

**ALERT – This handout provides critical information about what to do if you have a reaction to *contrast*, also called *X-ray dye*, *CT dye*, and *MR contrast*.**

You have had a moderate or severe allergic-like or hypersensitivity reaction to *contrast medium*, also called *X-ray dye*, *CT dye*, and *MR contrast*.

A future injection of contrast medium could result in a more serious or rarely, even a fatal reaction.

## For Your Future Safety

- Tell your doctor(s), any other health care providers, and anyone who schedules an appointment for you, that you had a reaction to a contrast agent.
- Having a reaction does not mean you should never have a contrast injection in the future. It does mean that special precautions and considerations are needed if you have an exam that uses contrast in the future. For example, you will likely be given steroid medicine to take ahead of time.
- Think about getting medic alert jewelry to wear. A medic alert bracelet or necklace tells emergency medical workers about your situation.

UW Medicine



**UWMC Imaging Services**

Box 357115  
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195  
206-598-6200

## Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns.

- UWMC Imaging Services: 206-598-6200
- Harborview Imaging Services: 206-744-3105
- Seattle Cancer Care Alliance: 206-288-7200