



# 환자교육

소화질환센터



## 위내시경

### 검사 이후 지시사항

검사 이후 7 일 동안 다음과 같은 증상이 있으면 지체하지 마시고 즉시 연락하십시오:

- 심상치 않은 복통이나 가슴이나 어깨의 통증
- 붉은 피를 토함
- 검은색의 대변
- 메스꺼움증이나 구토증
- 화씨 100 도(섭씨 37.8 도)보다 높은 고열
- 삼키기가 힘들

담당의사:

\_\_\_\_\_

- 정상시의 식사와 약을 다시 드시기 시작할 수 있습니다.
- 자신과 다른 사람의 안전을 위하여:
  - 오늘은 운전하지 마십시오. 이것은 불법입니다.
  - 오늘은 술을 마시지 마십시오.

### 검사 결과

- 검사의 결과는 정상입니다.
- 생체조직(조직 견본)을 떼어냈습니다. 2 주 정도가 되면 검사결과를 받으실 것입니다.
- \_\_\_\_\_ 개의 용정을 제거했습니다. 2 주 정도가 되면 검사결과를 받으실 것입니다.
- 낭종(물혹)을 떼어냈습니다.
- 출혈이 있는 곳이나 출혈이 생길 가능성이 있는 곳을 치료했습니다.
- 괄약근절개술(담관이나 췌장관 괄약근 절개)을 받으셨습니다.
- 다음 7 일 동안, 아스피린과 같은 진통제나 아이뷰프로펜(애드빌, 모트린)이나 네프록센(얼리브, 내프로신)과 같은 피가 묽어지게 하는 약을 복용하지 **마십시오**. 아세트아미노펜(타이레놀)은 드셔도 됩니다.
- 이 검사를 ( \_\_\_\_\_ ) 주/달/년에 다시 하십시오 \_\_\_\_\_.
- \_\_\_\_\_

### 질문사항?

주중 오전 8 시부터 오후 5 시까지는 206-598-4377 로 전화하십시오. 야간과 휴일과 주말에는 하버뷰 병원의 커뮤니티 케어 라인 206-744-2500 로 전화하십시오.

**UW Medicine**  
 UNIVERSITY OF WASHINGTON  
 MEDICAL CENTER

**Digestive Disease Center**  
 Box 356160  
 1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195  
 206-598-4377

# Patient Education

Digestive Disease Center



## EGD

### Instructions for after your test

Call us right away if you have any of these symptoms in the next 7 days:

- Unusual abdominal pain, chest pain or shoulder pain
- Vomiting red blood
- Having black stool
- Ongoing nausea or vomiting
- A fever higher than 100°F (37.8°C)
- Difficulty swallowing

Your doctor was:

\_\_\_\_\_

- You can resume your usual diet and medicines.
- **For your safety and the safety of others:**
  - Do not drive today. It is against the law.
  - Do not drink alcohol today.

### Your Test Results

- The results of your exam were normal.
- Biopsies* (tissue samples) were taken. Results will be sent to you in about 2 weeks.
- \_\_\_\_\_ *polyps* were removed. Results will be sent to you in about 2 weeks.
- A *cyst* (collection of fluid) was sampled.
- An area of bleeding or potential bleeding was treated.
- You have had a *sphincterotomy* (an incision into the bile duct or pancreatic duct sphincter).
- For the next 7 days, do **not** take pain medicines such as aspirin or blood-thinning medicines such as ibuprofen (Advil, Motrin) or naproxen (Aleve, Naprosyn). It is OK to take acetaminophen (Tylenol).
- Repeat this test ( \_\_\_\_\_ ) in \_\_\_\_\_ weeks/months/years.
- \_\_\_\_\_

UW Medicine

UNIVERSITY OF WASHINGTON  
MEDICAL CENTER

Digestive Disease Center

Box 356160

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195

206-598-4377

## Questions?

Call us at 206-598-4377 weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. After hours and on holidays and weekends, call the Community Care Line at Harborview Medical Center, 206-744-2500.

© University of Washington Medical Center  
Published: 11/2004, 07/2005, 05/2012  
Clinician Review: 05/2012

Reprints on Health Online: <http://healthonline.washington.edu>