



환자교육

소화질환센터



내시경 검사

(위쪽의) 검사 이후 지시사항

검사 이후 7 일 동안 다음과 같은 증상이 있으면 지체하지 마시고 즉시 연락하십시오:

- 심상치 않은 복통이나 가슴이나 어깨의 통증
- 붉은 피를 토함
- 검은색의 대변
- 계속 진행중인 메스꺼움증이나 구토증
- 화씨 100 도 이상 (섭씨 37.8 도)의 열
- 삼키기가 힘들

담당의사:

- 식사와 약은 평상시 대로 다시 드셔도 됩니다.
- 자신과 다른 사람의 안전을 위하여:
 - 오늘은 운전하지 마십시오. 이것은 불법입니다.
 - 오늘은 술을 마시지 마십시오.

검사 결과

- 검사의 결과는 정상입니다.
- 생체조직(세포조직의 견본)을 떼어냈습니다. 결과는 약 2 주 안에 보내드릴 것입니다.
- _____ 개의 용정을 제거했습니다. 결과는 약 2 주 안에 보내드릴 것입니다.
- 낭종(물혹)을 견본으로 떼냈습니다.
- 출혈이 있는 곳이나 출혈이 생길 가능성이 있는 곳을 치료했습니다.
- 괄약근절개술(담관이나 췌장관 괄약근 절개)을 받으셨습니다.
- 다음 7 일 동안, 아스피린과 같은 진통제나 아이뷰프로펜(애드빌, 모트린)이나 네프록센(얼리브, 내프로신)과 같은 피가 묽어지게 하는 약을 복용하지 **마십시오**. 아세트아미노펜(타이레놀)은 드셔도 **됩니다**.
- 이 검사를 (_____) 주/달/년에 다시 하십시오.
- _____

질문사항?

주중 오전 8 시부터 오후 5 시까지는 206-598-4377 로 전화하십시오. 업무시간 이후나 휴일과 주말에는 하버뷰 병원의 커뮤니티 케어 라인 206-744-2500 에 전화하십시오.

UW Medicine
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

Digestive Disease Center
Box 356160
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4377

Patient Education

Digestive Disease Center



Endoscopy

Instructions for after your test (upper)

Call us right away if you have any of these symptoms in the next 7 days:

- Unusual abdominal pain, chest pain or shoulder pain
- Vomiting red blood
- Having black stool
- Ongoing nausea or vomiting
- A fever higher than 100°F (37.8°C)
- Difficulty swallowing

Your doctor was:

- You can resume your usual diet and medicines.
- **For your safety and the safety of others:**
 - Do not drive today. It is against the law.
 - Do not drink alcohol today.

Your Test Results

- The results of your exam were normal.
- Biopsies* (tissue samples) were taken. Results will be sent to you in about 2 weeks.
- _____ *polyps* were removed. Results will be sent to you in about 2 weeks.
- A *cyst* (collection of fluid) was sampled.
- An area of bleeding or potential bleeding was treated.
- You have had a *sphincterotomy* (an incision into the bile duct or pancreatic duct sphincter).
- For the next 7 days, do **not** take pain medicines such as aspirin or blood-thinning medicines such as ibuprofen (Advil, Motrin) or naproxen (Aleve, Naprosyn). It is OK to take acetaminophen (Tylenol).
- Repeat this test (_____) in _____ weeks/months/years.
- _____

Questions?

Call us at 206-598-4377 weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. After hours and on holidays and weekends, call the Community Care Line at Harborview Medical Center, 206-744-2500.

UW Medicine
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

Digestive Disease Center
Box 356160
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4377

© University of Washington Medical Center
Published: 11/2004, 07/2005, 05/2012
Clinician Review: 05/2012
Reprints on Health Online: <http://healthonline.washington.edu>