



환자 교육

소화기 질환 센터



ERCP

내시경 역행 채담관 조영술 후 안내서

다음 7 일동안 아래와 같은 문제들이 있으시면 즉시 전화해 주십시오:

- 비정상적인 복통이나 가슴통증.
- 화씨 100 도 이상의 고열.
- 지속적인 구토.
- 붉은 피 구토.
- 검은 대변.
- 어려운 삼킴.

담당 의사 선생님은: _____.

정상적인 식사와 복용하시던 약들을 다시 시작 하십시오.

몇일동안은 목에 가벼운 통증이 있을수도 있습니다.

환자분과 다른분들의 안전을 위하여:

- 오늘은 운전하지 마십시오. 이것은 불법 입니다.
- 오늘은 술을 들지 마십시오.

결과

내시경 역행 채담관 조영술을 _____ 개월 후에 다시 하실것을 권합니다.

조임근 절개술(담관이나 췌장관 조임근 절개술)을 받으셨습니다. 다음 7 일동안은 아스피린, 진통제 또는 관절염약과 같은 혈약을 끊게하는 약(애드빌, 아이비프로펜, 모트린, 얼리브 그리고 내프로신)을 복용하지 마십시오. 타이레놀이나 아세트아미노펜은 드셔도 됩니다.

특별 지시 사항:

질문 있으십니까?

주중 오전 8 시부터 오후 5 시 사이에는 206-598-4377 로 전화해 주십시오. 그 외 시간에는 206-598-6190 호출기 교환수에게 전화하셔서 당직 위장병 전문의사 선생님과 상담을 부탁드립니다.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Digestive Disease Center
Box 356160
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4377

Patient Education

Digestive Disease Center



ERCP

Instructions for after your endoscopic retrograde cholangio-pancreatography

Call us right away if you have any of these problems in the next 7 days:

- Unusual abdominal pain or chest pain.
- A fever above 100°F.
- Persistent vomiting.
- Vomiting red blood.
- Black stool.
- Difficulty swallowing.

Your doctor was: _____

You can now start your usual diet and medications again.

You might have a mild sore throat for a few days.

For your safety and the safety of others:

- Do not drive today. It is against the law.
- Do not drink alcohol today.

Results

- Repeat ERCP recommended in _____ months.
- You have had a sphincterotomy (an incision into the bile or pancreatic duct sphincter). During the next 7 days, do not take aspirin, pain medications, or arthritis medicines that thin your blood (such as Advil, ibuprofen, Motrin, Aleve, and Naprosyn). You may take Tylenol or acetaminophen.

Special instructions:

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Digestive Disease Center

Box 356160

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195

206-598-4377

Questions?

Call us at 206-598-4377 weekdays between 8 a.m. and 5 p.m. At all other times, please contact the paging operator at 206-598-6190 and ask to speak to the gastroenterologist on call.