



Vismodegib

Dirección de esta página: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a612010-es.html>

Advertencia:

Para todos los pacientes:

Ninguna mujer que esté embarazada o que pudiera estarlo debe tomar vismodegib.

Su médico o farmacéutico le darán la hoja del fabricante con información para el paciente (Guía del Medicamento) al iniciar el tratamiento con vismodegib y cada vez que vuelva a surtir su receta. Lea atentamente la información y pídale a su médico o a su farmacéutico que le aclaren cualquier duda. Para conseguir la Guía del Medicamento, también puede visitar el sitio de Internet de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>) o el sitio de Internet del fabricante.

No done sangre mientras esté tomando vismodegib y durante, al menos, 7 meses después de su tratamiento.

No comparta el vismodegib con nadie, ni siquiera con otras personas que tengan los mismos síntomas que usted.

Consulte a su médico sobre el (los) riesgo(s) de tomar vismodegib.

Para las mujeres:

Si usted puede quedar embarazada, deberá evitar el embarazo durante el tratamiento con vismodegib. El resultado de la prueba de embarazo debe ser negativo la semana anterior al inicio de su tratamiento. Deberá usar métodos anticonceptivos aceptables durante su tratamiento y durante, al menos, 7 meses después de completar su tratamiento. Su médico le dirá qué métodos anticonceptivos son aceptables.

Si cree que está embarazada, si no se le presenta un periodo menstrual o si tiene relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo mientras está tomando vismodegib o en el término de 7 meses después de su tratamiento, llame a su médico de inmediato.

Para los hombres:

Deberá usar un condón con espermicida cada vez que tenga relaciones sexuales con una mujer embarazada o que pudiera quedar embarazada mientras usted está tomando vismodegib y durante 2 meses después de su tratamiento. Dígale a su médico inmediatamente si ha tenido relaciones sexuales sin protección con una mujer que puede quedar embarazada o si cree, por algún motivo, que su pareja está embarazada.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

El vismodegib se usa para tratar el carcinoma de células basales (un tipo de cáncer de piel) en las personas con un cáncer que se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El vismodegib también se usa para tratar el carcinoma de células basales que no puede ser tratado con cirugía ni radiación, o que ha reaparecido después de una cirugía. El vismodegib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la vía de Hedgehog. Actúa bloqueando la acción de una proteína que estimula la multiplicación de células cancerosas. Esto ayuda a detener o hacer más lenta la propagación de las células cancerosas, y podría contribuir a la reducción de los tumores.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación del vismodegib es en cápsulas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día, con o sin alimentos. Para que no olvide tomar vismodegib, tómelo, aproximadamente, a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado, y pídale a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome vismodegib exactamente según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.

Trague las cápsulas enteras; no las parta, ni mastique ni triture.

¿Qué otro uso se le da a este medicamento?

Este medicamento puede recetarse para otros usos; pídale más información a su médico o a su farmacéutico.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de tomar vismodegib:

- Informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico al vismodegib, a algún otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las cápsulas de vismodegib. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes o consulte la Guía del Medicamento.
- Informe a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios está tomando o planea tomar. No olvide mencionar ninguno de los siguientes: antiácidos; determinados antibióticos, como azitromicina (Z-Pak, Zithromax), claritromicina (Biaxin, en Prevpac) y eritromicina (E.E.S., Eryc, Ery-Tab, Erythrocin, PCE); un medicamento para la indigestión, la acidez estomacal o las úlceras, como cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid) y ranitidina (Zantac); e inhibidores de la bomba de protones, como dexlansoprazol (Dexilant), lansoprazol (Prevacid, en Prevpac), omeprazol (Prilosec, Zegerid), pantoprazol (Protonix) y rabeprazol (AcipHex). Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o controlarlo cuidadosamente por si presentara efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con el vismodegib, por lo que no olvide informar a su médico todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparezcan en esta lista.
- No dé el pecho mientras esté tomando vismodegib.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Si olvida una dosis, déjala pasar y continúe con su horario de medicación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

El vismodegib puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece:

- espasmos musculares
- dolor articular
- cansancio
- pérdida del cabello
- cambios en la percepción de los sabores o pérdida del sentido del gusto
- disminución del apetito
- pérdida de peso
- náuseas
- vómitos
- diarrea
- estreñimiento
- falta de algunos periodos menstruales

El vismodegib puede provocar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras está tomando este medicamento.

Si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de efectos adversos 'MedWatch' de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en la página de Internet [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] o por teléfono al 1-800-332-1088.

¿Cómo debo almacenar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y en un lugar alejado del exceso de calor y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera adecuada de desechar sus medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

No falte a ninguna cita con su médico.

Pregúntele a su farmacéutico cómo puede volver a surtir su receta.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

Marcas comerciales

- Erivedge®

Documento actualizado - 15/03/2012



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección

AHFS® Consumer Medication Information. © Copyright, 2012. The American Society of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso comercial, deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por HolaDoctor.



U.S. National Library of Medicine
NIH National Institutes of Health

Vismodegib

(vis'' moe deg' ib)

URL of this page: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a612010.html>

IMPORTANT WARNING:

For all patients:

Vismodegib should not be taken by women who are pregnant or who may become pregnant. There is a risk that vismodegib will cause loss of the pregnancy or will cause the baby to be born with birth defects (physical problems that are present at birth).

Your doctor or pharmacist will give you the manufacturer's patient information sheet (Medication Guide) when you begin treatment with vismodegib and each time you refill your prescription. Read the information carefully and ask your doctor or pharmacist if you have any questions. You can also visit the Food and Drug Administration (FDA) website (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>) or visit the manufacturer's web site to obtain the Medication Guide.

Do not donate blood while you are taking vismodegib and for at least 7 months after your treatment.

Do not share vismodegib with anyone else, even someone who has the same symptoms you have.

Talk to your doctor about the risk(s) of taking vismodegib.

For female patients:

If you can become pregnant, you will need to avoid becoming pregnant during your treatment with vismodegib. You must have a negative pregnancy test within 1 week of the start of your treatment. You must use acceptable forms of birth control during your treatment and for at least 7 months after your treatment is completed. Your doctor will tell you which forms of birth control are acceptable.

If you think you are pregnant, you miss a menstrual period, or you have sex without using birth control while taking vismodegib or within 7 months after your treatment, call your doctor immediately.

For male patients:

You must use a condom with a spermicide every time you have sexual contact with a female who is pregnant or able to become pregnant while you are taking vismodegib and for 2 months after your treatment. Tell your doctor immediately if you have had unprotected sex with a woman who can become pregnant or if you think for any reason that your partner is pregnant.

Why is this medication prescribed?

Vismodegib is used to treat basal cell carcinoma (a type of skin cancer) in people with cancer that has spread to other parts of the body. Vismodegib is also used to treat basal cell carcinoma that cannot be treated with surgery

or radiation or has come back after surgery. Vismodegib is in a class of medications called hedgehog pathway inhibitors. It works by blocking the action of a protein that signals cancer cells to multiply. This helps stop or slow the spread of cancer cells and may help shrink tumors.

How should this medicine be used?

Vismodegib comes as a capsule to take by mouth. It is usually taken once a day with or without food. To help you remember to take vismodegib, take it at around the same time every day. Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your doctor or pharmacist to explain any part you do not understand. Take vismodegib exactly as directed. Do not take more or less of it or take it more often than prescribed by your doctor.

Swallow the capsules whole; do not split, chew, or crush them.

Other uses for this medicine

This medication may be prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.

What special precautions should I follow?

Before taking vismodegib,

- tell your doctor and pharmacist if you are allergic to vismodegib, any other medications, or any of the ingredients in vismodegib capsules. Ask your pharmacist or check the Medication Guide for a list of the ingredients.
- tell your doctor and pharmacist what prescription and nonprescription medications, vitamins, nutritional supplements, and herbal products you are taking or plan to take. Be sure to mention any of the following: antacids; certain antibiotics such as azithromycin (Z-Pak, Zithromax), clarithromycin (Biaxin, in Prevpac), and erythromycin (E.E.S., Eryc, Ery-Tab, Erythrocin, PCE); a medication for indigestion, heartburn, or ulcers such as cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid), and ranitidine (Zantac); and proton-pump inhibitors such as dexlansoprazole (Dexilant), lansoprazole (Prevacid, in Prevpac), omeprazole (Prilosec, Zegerid), pantoprazole (Protonix), and rabeprazole (AcipHex). Your doctor may need to change the doses of your medications or monitor you carefully for side effects. Many other medications may also interact with vismodegib, so be sure to tell your doctor about all the medications you are taking, even those that do not appear on this list.
- do not breast-feed while you are taking vismodegib.

What special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.

What should I do if I forget a dose?

Skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed one.

What side effects can this medication cause?

Vismodegib may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are severe or do not go away:

- muscle spasms
- joint pain
- tiredness

- hair loss
- change in how things taste or loss of taste
- decreased appetite
- weight loss
- nausea
- vomiting
- diarrhea
- constipation
- missed menstrual periods

Vismodegib may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual problems while taking this medication.

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online [at <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] or by phone [1-800-332-1088].

What storage conditions are needed for this medicine?

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom). Throw away any medication that is outdated or no longer needed. Talk to your pharmacist about the proper disposal of your medication.

In case of emergency/overdose

In case of overdose, call your local poison control center at 1-800-222-1222. If the victim has collapsed or is not breathing, call local emergency services at 911.

What other information should I know?

Keep all appointments with your doctor.

Ask your pharmacist any questions you have about refilling your prescription.

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also important information to carry with you in case of emergencies.

Brand names

- Erivedge®

Last Revised - 03/15/2012



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS[®] Consumer Medication Information. © Copyright, 2012. The American Society of Health-System Pharmacists, Inc., 7272 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland. All Rights Reserved. Duplication for commercial use must be authorized by ASHP.