



UW Medicine

Acerca de su colposcopia

Que esperar

Su proveedor del cuidado de salud le ha recomendado tener un examen de colposcopia porque usted ha tenido un Papanicolaou anormal. Este folleto le informa qué esperar durante y después de este procedimiento.

¿Qué es una colposcopia?

La *colposcopia* es un examen del cuello uterino (la parte inferior y angosta de útero). Este examen es realizado usando un instrumento especial de aumento llamado colposcopio.

Este examen le ayudará a su médico a encontrar la causa anormal de su Papanicolaou.



Durante su colposcopia, su proveedor usará un instrumento especial de aumento para examinar su cuello uterino.

¿Qué puedo yo esperar?

Antes de su colposcopia, su proveedor le aplicará una solución de vinagre al cuello uterino. Esto hace que las áreas problemáticas sean más fáciles de observar. Su proveedor también puede aplicar yodo para ayudar a los tejidos anormales a mostrarse más claramente.

Si su colposcopia incluye una *biopsia*, su proveedor tomará pequeñas muestras de tejido y las raspaduras de las células de adentro de su cuello uterino. Este raspado es llamado *curetaje endocervical*. Esta muestra de tejido será mandada al laboratorio para pruebas.

Usted puede tener cólicos durante el procedimiento. Para la mayoría de las mujeres, este cólico se retira tan pronto termina el procedimiento.

¿Qué debo esperar después del procedimiento?

Si su colposcopia incluyo una biopsia, **no** coloque nada en su vagina por 1 semana. Esto incluye el no tener coito sexual, tampones, diafragma, o duchas vaginales.

Sangrado vaginal y manchado

Después de una biopsia, es normal el tener algo de sangrado vaginal. Este sangrado puede ser un manchado ligero con un flujo café o negro o un sangrado moderado.

También puede usted pasar un material arenoso oscuro. Esto es de la solución usada para parar el sangrado después de la biopsia. Esto es normal.

Cuando llamar: Si usted tiene mucho sangrado, por favor llame a la clínica.

Dolor

Es normal el tener algo de cólico por un día. Para el alivio, usted puede tomar ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, u otras marcas), 200 mg o 400 mg cada 6 horas.

Cuando llamar: Si usted tiene dolor severo, por favor llame a la clínica.

Infección

Una infección puede tomar varios días en desarrollarse.

Cuando llamar: Si usted tiene un flujo abundante con mal olor, por favor llame a la clínica.

Los resultados de la biopsia

- Le contactaremos con los resultados de 1 a 2 semanas con los resultados. Si usted no escucha nada de nosotros en la 3ra. semana después de su colposcopia, por favor llame a la clínica y pregunte por los resultados de la biopsia de su colposcopia. Los números telefónicos de la clínica están en la caja de “preguntas” en esta página.
- Si los resultados de su biopsia muestran:
 - Células levemente anormales (*atipia o displasia leve*), usted no necesitará tratamiento a menos que su condición continúe o se empeore. Le haremos saber cuándo tener un Papanicolaou de seguimiento o la prueba del virus del *papiloma humano* (VPH).
 - *Displasia severa*, su proveedor le contactará y hablará con usted acerca de su plan de cuidado.

¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Llame a su doctor o proveedor de la salud si usted tiene preguntas o preocupaciones.

Centro del Cuidado a la Mujer en UWMC-Roosevelt:
206.598.5500

Clínica de la Mujer en Harborview: 206.744.3367

Seguimiento

Recuerde, la colposcopia no es un tratamiento. Solamente le ayuda a su proveedor a encontrar porque usted tuvo un Papanicolaou anormal.

Su proveedor puede recomendarle que usted tenga tratamiento o más pruebas. Es muy importante seguir la recomendación de su proveedor para ayudar a prevenir el cáncer cervical.

About Your Colposcopy

What to expect

Your healthcare provider has advised you to have a colposcopy exam because you had an abnormal Pap smear. This handout tells you what to expect during and after this procedure.

What is a colposcopy?

A *colposcopy* is an exam of your *cervix* (the lower, narrow part of the uterus). The exam is done using a special magnifying tool called a *colposcope*.

This exam will help your provider find the cause of your abnormal Pap smear.



What can I expect?

Before your colposcopy, your provider will apply a vinegar solution to your cervix. This makes problem areas easier to see. Your provider may also apply iodine to help abnormal tissues show more clearly.

During your colposcopy, your provider will use a special magnifying tool to examine your cervix.

If your colposcopy includes a *biopsy*, your provider will take small samples of tissue and scrapings of cells from the inside of your cervix. This scraping is called *endocervical curettage*. The tissue sample will be sent to the lab for testing.

You may have cramping during the procedure. For most women, this cramping goes away soon after the procedure is over.

What can I expect after the procedure?

If your colposcopy included a biopsy, do **not** place anything in your vagina for 1 week. This includes no sexual intercourse, tampons, diaphragm, or douching.

Vaginal Bleeding and Spotting

After a biopsy, it is normal to have some vaginal bleeding. This bleeding may be light spotting with brown or black discharge or moderate bleeding.

You may also pass dark grainy material. This is from the solution used to stop bleeding after a biopsy. This is normal.

When to call: If you have a lot of bleeding, please call the clinic.

Pain

It is normal to have some cramping for a day. For relief, you may take ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, or other brands), 200 mg or 400 mg every 6 hours.

When to call: If you have bad pain, please call the clinic.

Infection

An infection may take several days to develop.

When to call: If you have a heavy discharge that smells bad, please call the clinic.

Biopsy Results

- We will contact you with results in 1 to 2 weeks with your results. If you do not hear from us by the 3rd week after your colposcopy, please call the clinic and ask for your colposcopy biopsy results. Phone numbers for the clinics are in the “Questions” box on this page.
- If your biopsy results show:
 - Mildly abnormal cells (*atypia* or *mild dysplasia*), you will not need treatment unless your condition continues or gets worse. We will let you know when to have a follow-up Pap smear or *human Papillomavirus* (HPV) test.
 - *Severe dysplasia*, your provider will contact you and talk with you about your care plan.

Follow-up

Remember, colposcopy is not a treatment. It only helps your provider find out why you had an abnormal Pap smear.

Your provider may advise you to have treatment or more tests. It is very important to follow your provider’s advice to help prevent cervical cancer.

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or healthcare provider if you have questions or concerns.

- Women’s Clinic at Harborview:
206.744.3367
- Women’s Health Care Center at UWMC-Roosevelt: 206.598.5500