

# Actividades de la vida diaria después de la cirugía DIEP

Este folleto indica las pautas a seguir después de su cirugía DIEP. Siga esta guía proteger el colgajo, las incisiones y asistir en su recuperación.

## Tipos de cirugía DIEP

La cirugía DIEP es unilateral (1 mama) o bilateral (ambas mamas).

Deberá seguir las instrucciones para:

- Unilateral (1 mama)
- Bilateral (ambas mamas)

Si no está seguro a que cirugía se sometió, su equipo medico puede ayudarle a marcar la casilla correcta.

## Proteja su solapa DIEP

Siga estas instrucciones durante **4 semanas** después de la cirugía, o hasta que su equipo de atención le indique lo contrario. Si se sometió a una cirugía **unilateral**, siga estas instrucciones para el brazo del lado quirúrgico. Si se sometió a una cirugía **bilateral**, siga estas instrucciones para ambos brazos.

- No levante, empuje ni tire de nada que pese más de 8 libras (un galón de leche pesa casi 9 libras).
- No alzar los brazos sobre el nivel de los hombros (90 grados), ni de frente ni de lado.
- No mueva el brazo hacia su espalda (detrás), except para usar el inodoro (*ver página 3*).
- No haga ningún *ejercicio aeróbico* que acelere sus latidos ni movimientos repetitivos con los brazos, como tareas domésticas (aspirar, lavar los platos y lavar la ropa).
- No use ropa que ejerza presión sobre sus senos.
- Evite esforzarse, sostener la respiración y pujar.

## Consejos para cambiar de posición

Para levantarse de una cama, silla o el inodoro:


- No se apoye en los reposabrazos con el brazo(s) del lado operado para levantarse y ponerse de pie. Incline su torso hacia adelante y tome impulso para pararse. Si necesita ayuda, su cuidador puede sostenerle desde las caderas pero **NO** tomarle de los brazos.
- Es más difícil levantarse de superficies bajas, hondas o blandas, como un sillón reclinable de cojines blandos o un sofá. Trate de sentarse en superficies más firmes y altas que sean más cómodas para ponerse de pie.
- Su *terapeuta ocupacional* (OT, por sus siglas en inglés) puede recomendar el uso de un asiento elevado para el inodoro, si el suyo es muy bajo.



Escanee con su teléfono para obtener una copia digital de este folleto.

### Para acostarse en la cama:

1. Siéntese más abajo de la mitad del colchón y lo más atrás que pueda del borde de la cama. No use los brazos para arrimarse hacia atrás ni para empujarse.
2. Acuéstese de lado. No trate de sujetarse con los brazos.
3. Permanezca de lado y mantenga las rodillas dobladas mientras levanta las piernas para ponerlas sobre la cama.
4. Mantenga las caderas y las rodillas juntas mientras se pone boca arriba.



**Unilateral:** levántese usando el brazo del lado no operado.

### Para levantarse de la cama:

Doble las rodillas y póngase de lado.

- **Si su cirugía fue unilateral:** puede levantarse apoyándose del brazo del lado no operado. *Vea el ejemplo en la foto a la derecha.*
- **Si su cirugía fue bilateral:** no se apoye o impulse con los brazos. Su cuidador debe tomarle de los hombros para sentarle, a la vez que usted baja las piernas de la cama. *Vea el ejemplo en la foto a la derecha.*






**Bilateral:** no trate de levantarse. Necesitará ayuda de su cuidador.

### Para vestirse

#### Camisas y chaquetas con botones:

- **Si su cirugía fue unilateral:** primero, coloque el brazo del lado operado en la manga. Use el brazo del otro lado para extender la camisa por la espalda y meterlo en la manga.
- **Si la cirugía fue bilateral:** coloque un brazo en la manga. Pídale a su cuidador que extienda la camisa por la espalda y le ayude a colocar el otro brazo en la manga.
- Otra opción es abotonar los 3 botones más bajos de su camisa. Luego colóquela por encima de la cabeza como si fuera una camiseta (*vea las instrucciones a continuación*).



## Camisetas (playeras) y camisetas sin mangas:

- **Si su cirugía fue unilateral:** pase los brazos a través de las mangas de la prenda colocada frente a usted, pasando primero el brazo del lado operado. Luego, use el brazo del lado no operado para pasar la camisa y bajarla sobre la espalda. No estire el brazo del lado operado hacia su espalda para bajarse la camisa.
- **Si su cirugía fue bilateral:** pase los brazos por las mangas de la camisa frente a usted. Recoja la parte de atrás de la camisa y pásela sobre su cabeza. Tenga cuidado de no levantar los codos a más de 90 grados (nivel del hombro). NO estire la mano del brazo del lado operado hacia su espalda para bajarse la playera. *(Vea el ejemplo al final de la página 2).*

## Pantalones y ropa interior:

- Puede subirse la ropa interior y los pantalones sobre los sitios de inserción del drenaje. Cuide de no doblar las sondas.
- Suba sus pantalones y la ropa interior **solo** por delante y los lados. No extienda la mano hacia su espalda. Es posible que necesite ayuda para subirse los pantalones por detrás, especialmente si son ajustados.
- Es posible que desee usar pantalones cortos o leggings de compresión para mayor comodidad. Estos también pueden cubrir los drenajes. Puede ser que necesite ayuda si es difícil subirlos.

## Calcetines y zapatos:

- Para evitar caerse, siéntese para ponerse los calcetines y los zapatos.
- Para evitar doblar el torso o la cintura, acerque el pie a usted. Este le será más cómodo mientras se recupera.

## Consejos para el baño

### Uso del inodoro:

- Puede mover la mano hacia su espalda **solo** para la higiene en el baño.
- Su terapeuta ocupacional puede aconsejarle un dispositivo de ayuda para el inodoro, un bidé o una botella de irrigación del perineo para facilitar su aseo.
- No se esfuerce, no retenga la respiración ni puje para evacuar las heces.

### Duchas:

- Puede ducharse después de su cirugía DIEP. Pida ayuda las primeras veces hasta que se sienta más fortaleza y seguridad.
- Sujete los drenajes a un cordón o collar y llévalos alrededor del cuello. Así evitará tirar de ellos o que se caigan.
- El agua y el jabón pueden correr sobre las heridas y drenajes. Evite frotar estas áreas y séquelas suavemente. No sumerja las heridas hasta que cicatricen por completo (no se bañe en tina ni en bañeras de hidromasaje).

- Puede lavarse el cabello y la cara si la hecha hacia adelante y levanta los brazos de frente para alcanzarla. Tenga cuidado de no levantar los codos más arriba de los hombros.
- Cuando se lave las axilas, levante solo los brazos hasta la altura de los hombros.
- Si se siente inestable o mareada estando de pie, su terapeuta ocupacional puede sugerir el uso de una silla de ducha o un banco de transferencia en la bañera.

### **¿PREGUNTAS?**

Sus preguntas son importantes. Llame a su médico o proveedor de atención médica si tiene preguntas o inquietudes.

# Activities of Daily Living After DIEP Surgery

*This handout gives guidelines to follow after your DIEP surgery. Follow these guidelines to protect your flap and incisions and to help your recovery.*



*Scan with your  
phone camera for  
a digital copy of  
this handout.*

## Types of DIEP Surgery

DIEP surgery is either *unilateral* (1 breast) or *bilateral* (both breasts). **You will need to follow the instructions for:**

- Unilateral (1 breast)
- Bilateral (both breasts)

If you are not sure which surgery you had, please ask your care team to help you mark the correct box above.

## Protect Your DIEP Flap

Follow these instructions for **4 weeks** after surgery, or until your care team tells you otherwise. If you had **unilateral** surgery, follow these directions for the arm on your surgical side. If you had **bilateral** surgery, follow these directions for both arms.

- Do not lift, push, or pull anything that weighs more than 8 pounds (a gallon of milk weighs almost 9 pounds).
- Do not reach higher than shoulder height (90 degrees) in front of you and out to the side.
- Do not reach behind your body except when using the toilet. (*See page 3*)
- Do not do any *aerobic exercise* which raises your heart rate. Do not do repetitive arm movements such as chores (vacuuming, dishes, and laundry).
- Do not wear clothes that put pressure on your breasts.
- Avoid straining, holding your breath, and bearing down.

## Movement Tips

### Standing up from a bed, chair, and toilet:

- Do not use your surgical-side arm(s) to push up from armrests to stand. Lean forward and use your momentum to stand. If you need help to stand up, your caregiver should assist from your hips, **NOT** your arms.
- It is harder to stand up from low, deep, or soft surfaces such as a soft recliner or couch. Try to sit on firmer, taller surfaces that are comfortable for you to stand up from.
- Your *occupational therapist* (OT) may advise you to use a raised toilet seat at home if your toilet is too low.


## Getting into bed:

1. Sit down near the top third of the bed. Aim to sit far back from the edge of the bed. Do not use your arms to scoot back or push yourself.
2. Lie down on your side. Do not try to brace yourself with your arms.
3. Stay on your side. Keep your knees bent while you lift your legs onto the bed.
4. Keep your hips and knees together while you roll onto your back.


## Getting out of bed:

Bend your knees and roll onto your side.

- **If your surgery was unilateral:** You may push to get up using only your non-surgical arm. *See the photo on the right for an example.*
- **If your surgery was bilateral:** Do not push up with your arms. Your caregiver should slide their arm behind your shoulder and help you sit up as you move your legs off the bed. *See the photo on the right.*



**Unilateral:** Push yourself up only with your non-surgical arm.



**Bilateral:** Do not push yourself up. You will need help from your caregiver.



## Getting Dressed

### Button-down shirts and jackets:

- **If your surgery was unilateral:** Put your surgical-side arm in your sleeve first. Then use your non-surgical arm to bring the shirt around your back and put your other arm in.
- **If your surgery was bilateral:** Put one arm into your sleeve. Ask your caregiver to bring your shirt around your back and help put your other arm in.
- Another option is to button the 3 lowest buttons of your shirt. Then put it on over your head like you would put on a t-shirt (*see instructions below*).

### Pullover T-shirts and tank tops:

- **If your surgery was unilateral:** Put your arms through the shirt sleeves in front of you, dressing the surgical side first. Then use your non-surgical arm to pull the shirt over your head and down in the back. Do not reach behind your back with the surgical arm to pull down your shirt.
- **If your surgery was bilateral:** Put your arms through the shirt sleeves in front of you. Then bunch up the back of the shirt and push it over your head. Be careful to avoid lifting your elbows higher than 90 degrees (shoulder level). Do NOT reach behind your back to pull down your shirt. (*See below.*)



## Pants and underwear:

- You may pull your underwear and pants up over your drain insertion sites. Check to make sure the drain lines are not kinked or bent.
- Pull up pants and underwear **only** in the front and the sides. Do not reach behind your back. You may need help to pull your pants up in the back, especially if they are tight.
- You may want to wear compression shorts or leggings for comfort. These can go over your drains as well. If they are difficult to pull up, you may need help.

## Socks and shoes:

- To avoid falling, sit down to put on your socks and shoes.
- To avoid bending at your abdomen or waist, bring your foot up to you. This movement may be more comfortable while you are healing.

## Bathroom Tips

### Using the toilet:

- You may reach behind your back **only** for toileting hygiene.
- Your OT may advise you to use a toilet aid device, a bidet, or peri bottle to make it easier to reach and clean yourself.
- Do not strain, hold your breath, or bear down with bowel movements.

### Showers:

- You can shower after your DIEP surgery. Have someone help you the first few times you shower, until you feel sure about your safety.
- Attach your drains to a lanyard or necklace and wear it around your neck. This will help prevent your drains being tugged or falling.
- It is okay for soap and water to run over your incisions and drains. Avoid scrubbing these areas and gently pat them dry. Do not submerge your incisions until fully healed (do not take a bath or sit in a hot tub).
- You can wash your hair and face by tucking your head down and lifting your arms in front of you to reach your head. Be careful that you do not lift your elbows higher than your shoulders.
- When washing your underarms, only lift your arms up to shoulder height.
- Your OT may suggest that you use a shower chair or tub transfer bench if you feel unsteady on your feet or get dizzy.

### Questions?

Your questions are important. Call your doctor or healthcare provider if you have questions or concerns.