



Antibióticos después de una prótesis articular

Precaución de por vida

Después de haber recibido una prótesis articular, usted necesitará tomar antibióticos profilácticos (preventivos) en todo momento en que tenga un procedimiento que pudiera hacer ingresar bacterias a su corriente sanguínea.

Llame al Centro de Cirugía del Hueso y Articulaciones al 206-598-4288 si tiene alguna pregunta acerca de si debe tomar antibióticos antes de un procedimiento que planea tener.

Ahora que tiene una prótesis articular, usted debe tomar una dosis de antibióticos antes de cualquier evento o procedimiento dental o médico que pudiera hacer ingresar bacterias a su corriente sanguínea. Tomar antibióticos ayudará a evitar una infección en su articulación.


Durante 3 meses después de la cirugía

No se someta a ningún procedimiento que implique a su sistema *respiratorio* (vías respiratorias y pulmones), sistema *digestivo* (*esófago*, el tubo de alimentación que desciende, estómago e intestinos) ni al *tracto urinario* (vejiga, riñones y conductos a través de los cuales pasa la orina). Asimismo, espere 3 meses para someterse a trabajo dental *electivo* (no obligatorio) luego de la cirugía de remplazo de articulación. Las únicas excepciones son en caso de que usted necesite un procedimiento de emergencia o un tratamiento para tratar una infección.

Trabajo dental

Recomendamos una dosis de antibióticos antes de cualquier tipo de trabajo dental, incluso una limpieza dental de rutina. Este “pre-tratamiento” es una precaución de por vida para los pacientes con prótesis articular.

- Si usted **no** es alérgico a la penicilina, tome 2 gramos de cefalexina, cefradina, o amoxicilina por vía oral **1 hora antes** de cualquier procedimiento dental.
- Si usted **es** alérgico a la penicilina, tome 600 miligramos de clindamicina **1 hora antes** de cualquier procedimiento dental.



Luego del remplazo de articulación, recomendamos una dosis de antibióticos antes de someterse a cualquier tipo de trabajo dental.

Su dentista o proveedor de atención primaria deberían poder recetar estos antibióticos para usted. Si su dentista tiene alguna pregunta, debe llamar al Centro de Cirugía de Hueso y Articulaciones del Centro Médico de la Universidad de Washington (UWMC) al 206-598-4288.

Si sus proveedores de atención a la salud tienen preguntas

Si su cirujano, proveedor de atención primaria o dentista tienen alguna pregunta acerca de los antibióticos profilácticos, por favor pídale que llamen al centro de Cirugía de Huesos y Articulaciones, al 206-598-4288 en el Centro Médico de la Universidad de Washington (UWMC).

¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Si tiene preguntas o inquietudes, llame a su médico o proveedor de atención a la salud. El personal de la clínica de UWMC también se encuentra disponible para ayudar.

Los días de semana de 8 a.m. a 5 p.m., llame al Centro de Cirugía de Huesos y Articulaciones al 206-598-4288.

Fuera de horas de oficina, durante fines de semana y días feriados, llame al 206-598-6190 y solicite que llamen por buscapersonas al Residente de Ortopedia de turno.

Procedimientos no Dentales

Si usted va a recibir un tratamiento que involucra el tracto respiratorio, digestivo o urinario, muy probablemente necesitará una dosis de antibióticos **antes** del procedimiento a fin de proteger su articulación artificial.

Asegúrese de que el médico que realiza su procedimiento sepa que usted tiene una prótesis articular y que necesita una dosis de antibióticos antes del procedimiento. Si su cirujano o proveedor de atención primaria tiene alguna pregunta acerca de los antibióticos profilácticos, indíquele que llame al Centro del Huesos y Articulaciones de UWMC, al 206-598-4288.

Procedimientos de alto riesgo

Estos son algunos de los procedimientos que tienen alto riesgo de ingresar bacterias a su corriente sanguínea. **Es muy importante tomar antibióticos antes de recibir cualquiera de estos procedimientos:**

Tracto respiratorio

- Tonsilectomía o adenoidectomía
- Cirugía que implica las membranas mucosas respiratorias
- Broncoscopia con un broncoscopio rígido

Tracto gastrointestinal (digestivo)

- Escleroterapia para várices esofágicas
- Dilatación de constricción esofágica
- Colangiografía endoscópica retrógrada con obstrucción biliar
- Cirugía del tracto biliar
- Cirugía que involucra los intestinos
- Colonoscopia o sigmoidoscopia

Tractos genital y urinario

- Cirugía de la próstata
- Citoscopia
- Dilatación uretral

Nota

Algunos proveedores de atención a la salud recomiendan antibióticos antes de los procedimientos de alto riesgo durante sólo 2 años después de su cirugía de prótesis articular. Sin embargo, el Centro de Cirugía de Huesos y Articulaciones de UWMC recomienda tomar antibióticos preventivos antes de los procedimientos de alto riesgo **por el resto de su vida.**

Antibiotics After Joint Replacement

A lifelong precaution

After you have had a joint replacement, you will need to take prophylactic (preventive) antibiotics any time you have a procedure that might bring bacteria into your bloodstream.

Call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288 if you have any questions about whether you need to take antibiotics before a procedure you are planning to have.

Now that you have a joint replacement, you must take a dose of antibiotics before any dental or medical procedure or event that might bring bacteria into your bloodstream. Taking antibiotics will help prevent infection in your joint.


For 3 Months After Surgery

Do **not** have any procedures that involve your *respiratory* system (airway and lungs), *digestive* system (*esophagus*, the tube food goes down; stomach; and intestines), or *urinary tract* (bladder, kidneys, and tubes urine goes through). Also, wait 3 months to have *elective* (not required) dental work after your joint replacement surgery. The only exceptions are if you need an emergency procedure or a procedure to treat an infection.

Dental Work

We recommend a dose of antibiotics before any type of dental work, even routine teeth cleaning. This “pre-treatment” is a lifelong precaution for patients with a joint replacement.

- If you are **not** allergic to penicillin, take 2 grams of cephalexin, cephradine, or amoxicillin by mouth **1 hour before** any dental procedure.
- If you **are** allergic to penicillin, take 600 milligrams of clindamycin **1 hour before** any dental procedure.



After joint replacement, we recommend a dose of antibiotics before you have any type of dental work done.

Your dentist or primary care provider should be able to prescribe these antibiotics for you. If your dentist has any questions, they should call the Bone and Joint Surgery Center at University of Washington Medical Center (UWMC) at 206-598-4288.

If Your Health Care Provider Has Questions

If your surgeon, primary care provider, or dentist has any questions about prophylactic antibiotics, please ask them to call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288 at University of Washington Medical Center (UWMC).

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns. UWMC clinic staff are also available to help.

Weekdays from 8 a.m. to 5 p.m., call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288.

After hours and on weekends and holidays, call 206-598-6190 and ask to have the Orthopaedic Resident on call paged.

Non-Dental Procedures

If you are going to have a procedure that involves the respiratory, digestive, or urinary tract, you will most likely need a dose of antibiotics **before** the procedure to protect your artificial joint.

Make sure that the doctor doing your procedure knows that you have a joint replacement and that you need a dose of antibiotics before your procedure. If your surgeon or primary care provider has any questions about prophylactic antibiotics, have them call UWMC's Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288.

High-Risk Procedures

These are some of the procedures that are high-risk for bringing bacteria into your bloodstream. **It is very important to take antibiotics before having any of these procedures:**

Respiratory Tract

- Tonsillectomy or adenoidectomy
- Surgery that involves respiratory mucous membranes
- Bronchoscopy with a rigid bronchoscope

Gastrointestinal (Digestive) Tract

- Sclerotherapy for esophageal varices
- Esophageal stricture dilation
- Endoscopic retrograde cholangiography with biliary obstruction
- Biliary tract surgery
- Surgery that involves the intestines
- Colonoscopy or sigmoidoscopy

Genital and Urinary Tracts

- Prostate surgery
- Cystoscopy
- Urethral dilation

Note

Some health care providers recommend antibiotics before high-risk procedures for only 2 years after your joint replacement surgery. But, UWMC's Bone and Joint Surgery Center advises taking preventive antibiotics before high-risk procedures **for the rest of your life.**