



ការធ្វើតេស្តថតពោះវៀន

ការរៀបចំខ្លួនធ្វើតេស្តដោយប្រើថ្នាំបញ្ឈប់: MoviPrep

ការធ្វើតេស្តថតពោះវៀនអ្នកគឺណាត់ជួប _____ ថ្ងៃ _____ ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ _____ ម៉ោង

<p>៧ថ្ងៃមុនធ្វើតេស្តថតពោះវៀន 7 Days Before</p> <p>ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ: _____ Date</p>	<ul style="list-style-type: none"> • បើអ្នកផឹកថ្នាំឈាមរាវដូចជា: Coumadin (Warfarin) or Plavix (clopidogrel) ចូរច្រាប់ត្រូវពេទ្យថាអ្នកមានការណាត់ថតពោះវៀននៅថ្ងៃ សួរគ្រូពេទ្យពីការណែនាំសំខាន់ៗក្នុងការផឹកថ្នាំឈាមរាវរបស់អ្នក • លប់ចោលការណាត់ថតពោះវៀន បើអ្នកត្រូវដាក់ឡើងវិញការថតពោះវៀនចូរអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ ២០៦ _____ • ពេលគ្រលប់ទៅផ្ទះវិញនឹងការដឹកជញ្ជូន ចាំបាច់ត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភក្តិ មកទទួលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលអ្នកបានធ្វើតេស្តរួច។ អ្នកមិនអាចបើកឡាន ជិះរថយន្តក្រុង តាក់ស៊ីឬប្រើប័រីសេវាដូចជា: Hope Link ឬ Paratransit បន្ទាប់ពីបាន ធ្វើតេស្តរួច
<p>៥ថ្ងៃមុនធ្វើតេស្តថតពោះវៀន 5 Days Before</p> <p>ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ: _____ Date</p>	<ul style="list-style-type: none"> • លប់ទទួលទានគ្រាប់ណាត់ឬគ្រាប់ធញ្ញជាតិ • លប់ផឹកថ្នាំអាយវិននិងថ្នាំវិភាមិនគ្រប់មុខដែលមានជាតិអាយវិន។ • បំពេញថ្នាំបញ្ឈប់: MoviPrep prescription. • អានក្រដាសអនុវត្តនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ • បើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ទូរស័ព្ទគ្រូពេទ្យដែលមើលថែរក្សាគ្រប់គ្រងថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នក ច្រាប់ត្រូវពេទ្យថាអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តថតពោះវៀន និងថ្ងៃខែដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្ត សួរគ្រូពេទ្យពីការណែនាំសំខាន់ៗសំរាប់ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមអ្នក ការថតមើលពោះវៀនរបស់អ្នក ត្រូវលប់ចោល បើអ្នកមិនមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភក្តិ មកទទួលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅពេលអ្នកធ្វើតេស្តរួច អ្នកត្រូវតែមាននរណាម្នាក់ដែលមានលទ្ធភាពអាចនៅជាមួយអ្នកពេញមួយថ្ងៃនៅពេលអ្នកមកធ្វើតេស្ត

<p style="text-align: center;">១ថ្ងៃមុន 1 Day Before</p> <p>ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ: _____ Date</p>	<ul style="list-style-type: none"> • អាហារពេលព្រឹក អ្នកអាចទទួលបាននំក្រាកក៏ សៀវភៅល្អឆ្លិនឬសៀវភៅល្អគ្រជាក់ បាយសរគុយទាវ ឬផាសស្លា • ពេលព្រឹកព្រលឹម រៀបចំ ថ្នាំបញ្ជា: MoviPrep solution. ចាក់កញ្ចប់កនិងកញ្ចប់ខទៅក្នុងធុងដាក់ទឹកក្ដៅអំឡុងថ្ងៃមួយដល់ខ្សែធុងខាងលើរួចដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកទុក។ • បន្ទាប់ពីម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ កុំទទួលបានអាហាររឹង។ ពេញមួយថ្ងៃផឹកតែទឹកថ្លា ដូចជាទឹកផ្លែឈើ ទឹកបោម ទឹកទំពាំងបាយជូរឬ ក្រូចបេរី ទឹកសុប ការហ្វេឡៅ ឬទឹកតែ • ម៉ោង៧ព្រឹក ផឹកដក់ដក់អោនថ្នាំបញ្ជា: MoviPrep ៥នាទីម្តង។ បន្ទាប់មកផឹកទឹកថ្លា៣២អោនយ៉ាងតិចបំផុត។ អាចធ្វើអោយរាករៀបចំធុងទឹកទុកក្នុងទូទឹកកក។
<p style="text-align: center;">នៅថ្ងៃធ្វើតេស្ត On Procedure Day</p> <p>ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ: _____ Date</p>	<ul style="list-style-type: none"> • កុំទទួលបានរបស់រឹង • ៥ម៉ោងមុនការណាត់ជួប ចាប់ ផ្ដើមផឹកទឹកឈាមរួច ពីធុងទឹករបស់ថ្នាំបញ្ជា: MoviPrep ផឹកដក់ដក់អោន៥នាទីម្តង។ បន្ទាប់ពីអ្នកផឹក ថ្នាំបញ្ជា: MoviPrep អស់ផឹកទឹកថ្លា អោយបានតិចបំផុត១៦អោន។ • ១ម៉ោងមុនឬក្រោយពីផឹក • ចាប់ពី២ម៉ោងមុនការណាត់ជួប ឈប់ទទួលបានអ្វីទាំងអស់តាមម៉ាត់។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវយកមកជាមួយនៅថ្ងៃណាត់ជួប • អ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារឬមិត្តភក្ដិ ថ្ងៃធ្វើតេស្តថតពោះរៀនអ្នក • បើសិនជាអាចសូមទុករបស់មាន តំលៃនៅផ្ទះឬអោយគ្រូមគ្រួសារទុកអោយដែលមានសុវត្ថិភាពជាង។

ទីកន្លែងនិងកន្លែងចតឡាន មន្ទីរពេទ្យហាប៊ីវិយូ

GI Endoscopy Suite

Maleng Building, 8th Floor

410 Ninth Ave., Seattle, WA 98104

206.744.3519

កន្លែងចតឡាន២៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ

៧ថ្ងៃក្នុង១អាទិត្យនៅលើផ្លូវ

Ninth and Jefferson Garage (P2) off James and Terry.

មន្ទីរពេទ្យ University of Washington Medical Center

Digestive Health Center

Surgery Pavilion, 3rd Floor

1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195

206.598.4377

From N.E. Pacific St., follow signs to the Emergency Room. At the stop sign, turn left into the Surgery Pavilion Parking Garage. After parking, take the elevator to the 3rd floor. Turn right into the Digestive Health Center.

ករណីអនុវត្តពិសេស

• បើអ្នកធ្វើកម្រិតទឹកនោមផ្អែម

ថ្នាំរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកែសម្រួលសំរាប់១ថ្ងៃមុននិងនៅថ្ងៃថតពោះវៀន។ ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមថាអ្វីអ្នកត្រូវធ្វើក្នុង២ថ្ងៃនេះ។

• បើអ្នកមានការពិបាកបត់ជើងធុនខ្លាំងឬធ្វើកម្រិតបំបាត់ការឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃ

ទិញ a bottle of Magnesium Citrate at a drugstore

២ថ្ងៃមុនការថតពោះវៀនម៉ោង៨ព្រឹកជីក១ដបពេញ។

អ្វីទៅការធ្វើតេស្តថតពោះវៀន

ការធ្វើតេស្តថតពោះវៀនគឺអោយគ្រូពេទ្យមើលទៅក្នុងជញ្ជាំងពោះវៀនជំរុំរបស់អ្នក។

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

អ្នកនឹងទទួលបានចាក់ថ្នាំរម្ងាប់ការឈឺចាប់ដែលធ្វើអោយអ្នកមានការច្របាច់ស្រាលតាមសូរម្រាមដាក់បញ្ឈប់ក្នុងសរសៃឈាម។

អ្នកជម្ងឺភាគច្រើនដេកលក់។ បើអ្នកអត់ដេកហើយវាមិនស្រួលសូមប្រាប់យើង។ យើងនឹងព្យាយាមធ្វើអោយអ្នកបានច្របាច់។

គ្រូពេទ្យអ្នកនឹងដាក់បំពង់ទៅយ៉ូដែលពាក់បានទៅក្នុងរន្ធកូដអ្នក។ បំពង់ទៅយ៉ូនោះមានបណ្តោយប្រវែងម្រាមដៃអ្នក។ គ្រូពេទ្យប្រហែលច្រើនសាច់ឬកាត់ចេញសាច់ដុះហៅថា polyps (growths).

ការថតពោះវៀនចំណាយពេលប្រហែល៣០ទៅ៤៥នាទី។ ការណត់ជួបប្រហែលជាយូរព្រោះសំរាប់ពេលរៀបចំនិងក្រោយពេលអ្នកធ្វើតេស្តថ្ងៃ។

បន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យនិងនិយាយជាមួយអ្នកអំពីលទ្ធផល។ បើលទ្ធផលរបស់អ្នកមិនបានភ្លាមយើងនឹងប្រាប់ថា នៅពេលណានឹងបានទទួលដំណឹង។

សំណួរ?

សំណួររបស់អ្នកគឺសំខាន់។ សូមទូរស័ព្ទបើអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់។ ក្នុងសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹកទៅម៉ោង៥ល្ងាចទូរស័ព្ទទៅគ្លីនិចថតពោះវៀននៅក្រោយម៉ោងធ្វើការនិងចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សំរាកបុណ្យទូរស័ព្ទ Community Care Line at Harborview, 206.744.2500.