

UW Medicine UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CENTER

Диета с ограниченным количеством жидкости

Инструкции

В данной брошюре приводятся общие инструкции о соблюдении диеты с ограниченным количеством жидкости. В ней перечислены продукты, которые следует учитывать при подсчете общего объема потребляемой жидкости, и советы о том, как лучше всего контролировать потребление жидкости.

Врач назначил вам диету с ограниченным количеством жидкости.

•	Вы можете употреблять каждые 24 часа.	ВСЕГО миллили	тров (мл) жидкости
	Это составляет около	унций (oz) или	чашек.

• Продолжайте соблюдать диету с ограниченным количеством жидкости до тех пор, пока врач не скажет, что вам можно пить жидкость в обычном объеме.

Некоторые продукты питания считаются жидкостью

Некоторые продукты питания внешне могут быть не похожи на жидкость, но их, тем не менее, следует считать жидкостью при подсчете общего объема потребляемой жидкости. Это вызвано тем, что:

 Они превращаются в жидкость при комнатной температуре

или

• Их основным компонентом является жидкость

или

• Эти продукты в натуральном виде содержат много жидкости.

Полезный совет: Если продукт тает при комнатной температуре, его следует считать жидкостью.



Большинство фруктов содержит большое количество воды. Они считаются жидкостью, если вы соблюдаете диету с ограниченным количеством жидкости.

Примеры продуктов, которые следует считать жидкостью

Эти продукты питания считаются жидкостью:

- Приготовленные каши
- Заварной крем
- Желатин (Jell-O)
- Лед и ледяная стружка
- Мороженое и шербет (фруктовое мороженое)
- Молочные коктейли

- Большинство фруктов и некоторые овощи
- Фруктовое мороженое на палочке
- Пудинг
- Соусы и подливы
- Суп и бульон
- Йогурт

Измерение объема жидкости

Объем жидкости, который вам можно употреблять в течение 24 часов, измеряется в миллилитрах (мл). По этой таблице вы сможете определить, сколько мл содержится в других единицах измерения, которыми вы пользуетесь.

Количество мл	Эквивалент	Эквивалент	Эквивалент
15 мл	3 чайных ложки	1 столовая ложка	
30 мл	1 жидкая унция	2 СТОЛОВЫХ ЛОЖКИ	
120 мл	1∕2 чашки	4 унции	
180 мл	3/4 чашки	6 унции	
240 мл	1 чашки	8 унций	
500 мл	2 чашки	16 унций	
960 мл	4 чашки	32 унции	1 литр
1,200 мл	5 чашек	40 унций	1,2 литра
1,500 мл	6 ^{1/4} чашки	50 унций	1,5 литра
2,000 мл	8 ^{1/3} чашки	67 унций	2 литра

Советы по ограничению потребления жидкости

- Используя мерную чашку для жидкостей, определите, сколько жидкости содержится в ваших обычных стаканах и чашках. Это поможет вам спланировать потребление жидкости в течение дня и подсчитать ее объем.
- Не забудьте учесть жидкость, которой вы запиваете лекарства, и воду, которую вы пьете между приемами пищи.
- Вы должны точно измерить и подсчитывать объем потребляемой жидкости. Для этого вам нужно вести «журнал учета»:
 - Запишите, сколько жидкости вам можно употреблять в течение 24 часов.
 - Каждый раз, когда вы употребляете жидкость, измеряйте ее объем и записывайте его в журнал.
 - Вычитайте этот объем из вашей суточной нормы, чтобы знать, сколько еще жидкости вам можно употребить до конца дня.
- Сцеживайте консервированные фрукты и овощи, чтобы сироп или сок, в котором они содержатся, не засчитывался в вашу суточную норму.
- Обязательно учитывайте супы, бульон, фруктовое и обычное мороженое на палочке или в брикете и другие продукты, содержащие жидкость.
- Избегайте соленой пищи. От соли у вас повысится жажда.
- Пейте только тогда, когда хочется.

- Если у вас сухость во рту, попробуйте следующее:
 - Сосать дольку лимона, кусочек льда или леденец
 - Жевать жевательную резинку
 - Полоскать рот водой, не глотая при этом воду

Жидкости в некоторых продуктах питания

Ниже приводится перечень некоторых продуктов питания и объем содержащейся в ней жидкости:

Продукт	Количество продукта	Объем жидкости
• Приготовленные каши		
• Желе (Jell-O)		
• Мороженое	Все продукты в этой	Все продукты в этой группе: 120 мл (4 унции)
• Сок	группе: ½ чашки (4 унции)	
• Пудинг		жидкости
• Шербет (фруктовое мороженое)		
• Суп		
• Йогурт		
• Фрукты	1 чашка	120 мл (4 унции)
• Ледяная стружка		жидкости
• Фруктовое мороженое на палочке	1	90 мл (3 унции) жидкости
• Газированные напитки	12 унций	360 мл (12 унций) жидкости
• Молочный коктейлье	16 унций	480 мл (16 унций) жидкости

Вопросы?

Ваши вопросы очень важны. Если у вас есть вопросы или проблемы, позвоните своему врачу или поставщику медицинских услуг.

Диетолог / специалист по питанию:

UW Medicine UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CENTER

Fluid-Restricted Diet

Guidelines to follow

This handout gives basic guidelines for a fluid-restricted diet. It includes a list of foods that should be counted as part of fluid intake, and tips to help with fluid control.

Your doctor has placed you on a fluid-restricted diet.

- You may have ONLY ____ milliliters (mL) of fluid in 24 hours.
 This is about ____ ounces (oz), or ____ cups.
- Continue on this restricted diet until your doctor tells you it is OK to drink the amount of fluids you normally drink.

Some Foods Count as Fluids

Some foods may not seem like liquid, but you still must count them as a part of your fluid intake. This is because:

- They are liquid at room temperature, OR
- A liquid is the main ingredient in the food, OR
- The food naturally contains a lot of liquid.

Here is a helpful tip to remember: **If a food melts at room temperature, it counts as a fluid.**



Most fruits contain a lot of water. They count as a fluid when you are on a fluid-restricted diet.

Examples of Foods that Count as Liquids

These foods count as fluids:

- Cooked cereal
- Custard
- Gelatin (Jell-O)
- Ice and ice chips
- Ice cream and sherbet
- Milkshakes

- Most fruits and some vegetables
- Popsicles
- Pudding
- Sauces and gravies
- Soup and broth
- Yogurt

Measuring Fluids

The amount of fluid you are allowed to have in 24 hours is measured in milliliters (mL). Use this table to help figure out how many mL are in other measurements you may use.

Number of mL	Equals	Equals	Equals
15 mL	3 teaspoons	1 tablespoon	
30 mL	1 fluid oz	2 tablespoons	
120 mL	½ cup	4 oz	
180 mL	3∕4 cup	6 oz	
240 mL	1 cup	8 oz	
500 mL	2 cups	16 oz	
960 mL	4 cups	32 oz	1 liter
1,200 mL	5 cups	40 oz	1.2 liters
1,500 mL	6¼ cups	50 oz	1.5 liters
2,000 mL	8 ¹ /3 cups	67 oz	2 liters

Tips for Fluid Control

- Use a liquid measuring cup to measure the amount of fluid that your regular cups and glasses hold. This will help you plan and count your fluids for the day.
- Be sure to include the liquid you will use for taking your medicines or for sips of water between meals.
- Do not guess at your fluid intake. Keep a "liquid log":
 - Write down how much fluid you can have in 24 hours.
 - Each time you have some fluid, measure it and write it in your log.
 - Subtract that amount from your daily allowance so that you know how much you have left for the rest of the day.
- Drain all canned fruits and vegetables before you eat them so the juices do not count toward your allowance.
- Make sure to count soups, broths, popsicles, ice cream bars, and other foods that contain liquid as part of your intake.
- Avoid salty foods. They can make you more thirsty.
- Drink only when you are thirsty.

- If your mouth is dry, try:
 - Sucking on a lemon wedge, ice cubes, or hard candy
 - Chewing gum
 - Rinsing your mouth out with water, but do not swallow the water

Fluids in Some Foods

Here are some foods and the amount of fluid they contain:

Food	Amount of Food	Fluid It Contains
Cooked cereal		
• Gelatin dessert (Jell-O)		
• Ice cream		
• Juice	All in this group:	All in this group:
 Pudding 	½ cup (4 oz)	120 mL (4 oz) fluid
• Sherbet		
• Soup		
• Yogurt		
• Fruit	1	190 (4) fl.::d
• Ice chips	1 cup	120 mL (4 oz) fluid
Popsicle	1	90 mL (3 oz) fluid
• Soda	12 oz	360 mL (12 oz) fluid
Milkshake	16 oz	480 mL (16 oz) fluid

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns.

Dietitian/Diet Technician: