

Instrucciones para después del estudio de pH con cápsula bravo

La probabilidad de tener complicaciones relacionadas con este procedimiento es muy baja. Sin embargo, es importante saber qué síntomas vigilar y cómo obtener ayuda si la necesita.

Instrucciones:

- Puede comenzar a comer su dieta normal cuando el tragar se sienta cómodo.
- Es normal tener un dolor de garganta leve por unas horas. Las pastillas para la garganta y/o tos pueden ayudar.
- Siga todas las instrucciones de su equipo de atención.
- No planifique tener pruebas de resonancia magnética (MRI) por 30 días después de la colocación de la cápsula bravo.



Use la cámara de su teléfono para obtener una copia digital de este folleto.

Señales de alarma

Llame si presenta:

- Temperatura de 100.5° F o más.
- Dolor inusual en el pecho o el abdomen (estómago).
- Dificultad para tragar o para mover el cuello.
- Vómitos con sangre.
- Sangre en las heces.



Llame a la clínica si tiene alguna pregunta sobre su procedimiento.

A quién llamar

Si tiene cualquiera de los síntomas anteriores o cualquier otra pregunta, llámenos de inmediato:

Center for Esophageal and Gastric Surgery - Lab (Laboratorio del Centro de Cirugía Esofágica y Gástrica):

- **Lunes a viernes**, de 7 a. m. a 5 p. m.: Llame al 206.598.7350
- **Fuera de horario, fines de semana y feriados:** 206.598.6190 Pida al operador que comunique el mensaje al miembro del equipo de guardia de ***Surgery O (Cirugía O)***.

¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Llame a su médico o proveedor de atención médica si tiene dudas o preocupaciones.

- **Center for Esophageal and Gastric Surgery - Lab:** 206.598.7350