

UW Medicine UNIVERSITY OF WASHINGTON

جراحة المرارة بالمنظار كيف تستعد و ماذا تتوقع

هذه النشرة للمرضي الذين سيجرون جراحة بالمنظار لإستئصال المرارة. إنها تشرح ماذا عليك أن تتوقع وكيف تستعد للجراحة وكيف تُخطط لتعافيك.

ماهى جراحة المناظير؟

في الجراحة بالمنظار، يتم إجراء 4 شقوق صغيرة أو أكثر في جسمك. تترك هذه الطريقة ندوباً أصغر من الجراحة المفتوحة. وذلك يجعل تعافيك بشكل أسرع.

فى جراحة المرارة بالمنظار (أستئصال المرارة) سيستخدم الجراح أدوات خاصة لإزالة المرارة. سيتم إدخال هذه الأدوات من خلال شقوق صغيرة في بطنك.

فى أثناء الجراحة سيتم ملء بطنك بغاز ثانى أكسيد الكربون، هذا سيرفع جلدك بعيداً عن أعضائك حتى يتمكن طبيبك من رؤية المنطقة بشكل أفضل.

كبف تستعد

- الأدوية: لا تتناول الأسبرين أو أى منتجات تؤثر على تخثر الدم لمدة أسبوع قبل إجراء الجراحة. أثنين منهم هم الإبيوبروفين (أدفيل أو موترين) و نابروكسين (اليف أو نابروسين). أنظر النشرة المرفقة لمزيد من المعلومات.
- الحلاقة: لا تقوم بحلاقة أي جزء من جسمك لم تكن تحلقه يومياً. إذا كنت معتاداً على حلاقة الجزء القريب من مكان إجراء الجراحة فلا تقم بحلاقة هذا الجزء لمدة يومان (48 ساعة) قبل جراحتك.
 - العودة للمنزل: خطط أن يقوم بتوصيلك من المستشفي لمنزلك شخص بالغ و يبقى معك الليلة الأولى. لا يُمكنك القيادة بنفسك و لا يُمكنك أن تستقل سيارة أجرة أو حافلة نقل ركاب من المستشفى إلى المنزل.



سيتم إجراء جر احتك بجناح الجر احة بالمركز الطبي بجامعة واشنطن

يوم قبل الجراحة

• موعد الوصول: سيتصل بك منسق مواعيد غرفة العمليات الساعة 5 مساءً في الليلة السابقة قبل عمليتك و سيُخبرك بموعد حضورك للمستشفي. إذا كانت جراحتك يوم الأثنين سيتصل بك منسق المواعيد يوم الجمعة السابق للجراحة.

إذا لم تتلق هذا الأتصال حتى 5 مساءً، أتصل أنت بالرقم 206.598.6541.

- الأستحمام: أستحم بالليلة السابقة لجراحتك. أستخدم الصابون الخاص المضاد للبكتيريا الذي أعطته لك ممرضتك.
- لا تستخدم هذا الصابون الخاص على وجهك و شعرك أو الأجزاء الخاصة. أستخدم الصابون و الشامبو الخاص بك على هذه المناطق (أنظر إلى الأرشادات المرفقة بالصابون).
 - أستخدم مناشف نظيفة للتجفيف و أرتدى ملابس نظيفة.

رم الجراحة

- الأستحمام بالمنزل: أستحم في صباح يوم جراحتك. أتبع نفس خطوات أستحمامك التي أتبعتها عند أستحمامك بالليلة السابقة.
- بطانية تدفئة: سنقوم في المستشفي بتغطيتك ببطانية تدفئة خلال أنتظارك للذهاب إلي غرفة العمليات. هذه ستُشعر جسمك بالدفء و تُساعد في منع التلوث.

ابعد الجراحة

تذهب لمنزلك في الليلة بعد جراحتك أو صباح اليوم التالي. قم بترتيب شخص بالغ مسئول ليقوم بتوصيلك إلى منزلك من المستشفي. إذا عدت لمنزلك في نفس يوم جراحتك، قم بترتيب شخص بالغ ليبقى معك الليلة الأولى.

للمتك

ستؤثر الأدوية التي أخذتها خلال و ما بعد جراحتك على قدرتك على التفكير بوضوح. خلال 24 ساعة التالية لجراحتك

لا تقم بما يلي:

- القيادة
- السفر وحدك
- أستخدام الآلات
- شرب الكحول
- التوقيع على أوراق رسمية أو اتخاذ قرارات مهمة
- تكون مسئولاً عن الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو عن شخص بالغ يحتاج لعنايتك.

العناية بالجرح

- ستُغطي جروحك بضمادات بلاستيكية. تستطيع أن تزيل الضمادات البلاستيكية و تستحم بعد 48 ساعة من الجراحة.
 - أستحم يومياً بعد أن تزيل الضمادات البلاستيكية . لا تقم بدعك مكان الجروح.
 - تحت الضمادات ستكون الجروح مغطاة بشرائط بيضاء تُسمي شرائط ستيري. هذه الشرائط ستسقط بنفسها بعد بضعة أيام.
- قم بفحص جروحك يومياً لملاحظة أي أعراض للتلوث و المذكورة أسفل تحت عنوان " متى تتصل".

الأدوية

- **لا** تتناول الأسبرين أو أى منتجات أخرى تؤثر على تخثر الدم لمدة يومان بعد جراحتك (أنظر المنشور المرفق).
 - تتاول أدوية الآلم كما تم وصفها لك.
 - أبدأ في تناول أدويتك المعتادة كما تم وصفها لك.

العودة للعمل

عُد إلي عملك عندما تشعر أنك على ماير ام لتقوم بذلك. معظم الناس يستطيعون العودة لعملهم خلال أسبوع.

متى تتصل

أتصل بخط نصيحة الممرضة على الرقم 206.598.4477 . أو بطبيبك إذا كان لديك:

- نزيف أو أرتشاح يبلل غياراتك
- حمى أكثر من 100.5 فهرنهايت (أي 38 درجة مئوية)
 - رعشة و أنتفاض
 - أي مظاهر للتلوث بجروحك:
 - إحمرار أو تورم - ألم يزداد سوءاً
- إفرازات ذات رائحة كريهة، أو تغيير في نوع أو كمية الإفرازات
 - غثيان
 - قے

الأسئلة؟

أسلتك مهمة. أتصل بطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية لك إذا كان لديك أسئلة أو مخاوف. أيام الأسبوع 8 ص- 4 م.

> أتصل لطلب نصيحة ممرضة لتخصصات الجراحة على رقم 206.598.4477

مابعد ساعات العمل و في عطلات نهاية الأسبوع أو الأجازات أتصل على

206.598.6190 و أطلب التواصل مع طبيب الجراحة المقيم المناوب. أو أطلب التواصل مع الجراح الخاص بك

د.

UW Medicine UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CENTER

Laparoscopic Gallbladder Surgery

How to prepare and what to expect

This handout is for patients who are having laparoscopic surgery to remove their gallbladder. It explains what to expect, how to prepare for surgery, and how to plan for your recovery.

What is laparoscopic surgery?

In *laparoscopic surgery*, 4 or more small incisions are made in your body. This method leaves smaller scars than *open surgery*. You should also have a faster recovery.

In laparoscopic gallbladder surgery (cholecystectomy), your surgeon will use special tools to remove your gallbladder. These instruments will be inserted through small incisions in your abdomen.



Your surgery will be done in the Surgery Pavilion at University of Washington Medical Center.

During surgery, your abdomen will be filled with *carbon dioxide* (CO_2) gas. This lifts your skin away from your organs so that your doctor can see the area better.

How to Prepare

- **Medicines:** Do **not** take aspirin or other products that affect blood clotting for 1 week before your surgery. Two of these are ibuprofen (Advil, Motrin) and naproxen (Aleve, Naprosyn). See attached sheet for more information.
- **Shaving:** Do **not** shave any part of your body that you do not already shave every day. If you normally shave near your surgical site, do not shave that area for 2 days (48 hours) before your surgery.
- **Going home:** Plan for a responsible adult to drive you home from the hospital and stay with you the first night. You cannot drive yourself or take a taxi or bus home alone from the hospital.

Day Before Surgery

• **Arrival time:** An OR (operating room) scheduler will call you by 5 p.m. the night before your surgery and tell you when to come to the hospital. If your surgery is on a Monday, the scheduler will call you the Friday before.

If you do not receive this call by 5 p.m., call 206.598.6541.

- **Shower:** Take a shower the night before your surgery. Use the special antibacterial soap your nurse gave you.
 - Do **not** use the special soap on your face, hair, or private parts.
 Use your own soap and shampoo on those areas. (See the directions that came with the soap.)
 - Use clean towels to dry off, and put on clean clothing.

Surgery Day

- **Shower at home:** Take a shower in the morning of your surgery. Follow the same steps as you did for your shower the night before.
- **Heating blanket:** At the hospital, we will cover you with a heating blanket while you wait to go into the OR. This warms your body and helps prevent infection.

After Surgery

You will go home the night after your surgery or the next morning. Plan for a responsible adult to drive you home from the hospital. If you go home the same day as your surgery, plan for an adult to stay with you the first night.

For Your Safety

Medicines you receive during and after your surgery will affect your ability to think clearly. For 24 hours after your surgery, do **not**:

- Drive
- Travel by yourself
- Use machines
- Drink alcohol
- Sign legal papers or make important decisions
- Be responsible for children, pets, or an adult who needs care

Incision Care

- Your incisions will be covered by plastic bandages. You can remove the plastic bandages and shower 48 hours after surgery.
- After removing the plastic bandages, shower every day. Do **not** scrub the incision site.
- Under the bandages, your incisions will be covered by white tapes called Steri-Strips. These tapes will fall off by themselves after several days.
- Check your incisions every day for the signs of infection listed under "When to Call," below.

Medicines

- Do **not** take aspirin or other products that affect blood clotting until 2 days after your surgery (see attached sheet).
- Take your pain medicines as prescribed.
- Start taking your regular medicines as prescribed.

Return to Work

Return to work when you feel OK doing so. Most people can go back to work within 1 week.

When to Call

Call the Nurse Advice Line at 206.598.4477 or your doctor if you have:

- Bleeding or drainage that soaks your dressing
- A fever higher than 100.5°F (38°C)
- Shaking and chills
- Any sign of infection in your incisions:
 - Redness or swelling
 - Pain that is getting worse
 - Drainage that smells bad, or a change in the type or amount of drainage
- Nausea
- Vomiting
- Yellow skin (*jaundice*)
- Any concerns that cannot wait until your follow-up visit

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or healthcare provider if you have questions or concerns.

Weekdays from 8 a.m. to 4 p.m., call the Surgical Specialties Nurse Advice Line at 206.598.4477.

After hours and on weekends and holidays, call 206.598.6190 and ask for the resident on call for Surgery to be paged.

Or, ask for yo	our surgeon to b	Э6
paged:		

υr.		