

**У вас есть
вопросы?**

Ваши вопросы важны. Звоните своему врачу или поставщику медицинского обслуживания, если у вас есть вопросы или вас что-либо беспокоит. Сотрудники клиники UWMC также могут оказать помощь.

В рабочие дни с 8 утра до 5 вечера звоните на линию оставления сообщений медсестрам по телефону 206-598-7519. Вам перезвонят в кратчайший возможный срок.

В нерабочие часы и в выходные и праздничные дни звоните по телефону 206-598-6190 и попросите, чтобы к телефону вызвали дежурного отоларинголога.

UW Medicine

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

**Otolaryngology – Head and Neck
Surgery Center**

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4022

**Звоните медсестре клиники
или дежурному врачу, если у
вас:**

- температура выше 101°F (38.3°C)
- кровотечение из уха
- *вертиго* (головокружение)

Примечания

[illegible]

Информация для пациентов

**Отделение отоларингологии – Центр
хирургии головы и шеи**

Транстимпанальное нагнетание лекарственных препаратов в улитку

О вашей процедуре

В ходе *транстимпанального нагнетания лекарственных препаратов в улитку* врач введет вам лекарство во внутреннее ухо. Для этого врач вводит иглу через барабанную перепонку (англ. *the tympanic membrane*). Лекарство затем поступает (*вливается*) во внутреннее ухо.

Этот материал объясняет, как делают эту процедуру, как подготовиться к ней и чего ожидать после процедуры.

UW Medicine

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

Как подготовиться к процедуре

- Договоритесь, чтобы вас отвезли домой после процедуры, если возможно.
- Вы можете нормально питаться и принимать лекарства, которые вы обычно принимаете.

Как делают процедуру

Эту процедуру делают в клинике, и обычно она занимает меньше 1 часа. Это включает время на восстановление после процедуры.

На барабанной перепонке делают местную анестезию (обезболивание). Затем на барабанной перепонке делают небольшой надрез и вставляют туда маленькую трубочку. Затем делают инъекцию антибиотика (гентамицин) или стероидного препарата (дексаметазон) во внутреннее ухо.

Количество получаемых инъекций и продолжительность лечения будет зависеть от плана лечения.

Чего ожидать после процедуры

Побочные эффекты

Если в ходе лечения вы получали гентамицин, вы можете испытывать незначительные нарушения равновесия в течение 7-10 дней после его применения.

Боль

Большинство пациентов практически не испытывает боли после этой процедуры. Если необходимо, вы можете принимать ацетаминофен (тайленол) или ибупрофен (адвил, мотрин).

Питание

Вы можете питаться нормально.

Выход на работу

После этой процедуры вы можете выходить на работу.

Предосторожности и уход за собой для скорейшего восстановления

- **Не** допускайте, чтобы в ухо попадала вода, пока врач не скажет вам, что ухо можно мочить.

Последующее наблюдение

Вам надо будет часто ходить в клинику для проверки слуха. Ваш врач скажет вам, как часто вам надо будет приходить.

Ваши приемы последующего наблюдения:

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns. UWMC staff are also available to help.

Weekdays from 8 a.m. to 5 p.m., call the Nurse Voice Mail Line at 206-598-7519. Your call will be returned as soon as possible.

After hours and on holidays and weekends, call 206-598-6190 and ask for the Otolaryngologist on-call to be paged.

UW Medicine
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

**Otolaryngology – Head and
Neck Surgery Center**
Box 356161
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4022

Call the Clinic Nurse or Doctor On-Call If You Have:

- A fever higher than 101°F (38.3°C)
- Drainage from your ear
- *Vertigo* (feeling dizzy)

Notes

[illegible]

© University of Washington Medical Center
Published: 06/2004, 07/2011
Clinician Review: 07/2011
Full Online: <http://healthonline.washington.edu>



Transtympanic Cochlear Perfusion Therapy

About your procedure

In *transtympanic cochlear perfusion therapy*, your doctor will inject medicine into your inner ear. To do this, your doctor will insert a needle through your eardrum (the *tympanic membrane*). The medicine then moves (*perfuses*) into your inner ear.

This handout explains how the procedure is done, how to prepare for it, and what to expect afterward.

UW Medicine
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

How to Prepare for Your Procedure

- Arrange for someone to drive you home after your procedure, if possible.
- You may eat normally and take your regular medicines.

How the Procedure Is Done

This procedure takes place in the clinic and usually lasts less than 1 hour. This includes recovery time.

A local *anesthetic* (numbing medicine) is applied to your eardrum. Then, a small incision is made in your eardrum and a small tube is inserted through this incision. An antibiotic (Gentamycin) or a steroid medicine (Dexamethasone) is then injected into your middle ear.

The number of injections you receive and the length of your overall treatment will be based on your treatment plan.

What to Expect After Your Procedure

Side Effects

You may have mild imbalance for 7 to 10 days if you were treated with Gentamycin.

Pain

Most patients have very little pain after this procedure. You may take acetaminophen (Tylenol) or ibuprofen (Advil, Motrin) if needed.

Diet

You may eat normally.

Return to Work

You will not need to take time off work after this procedure.

Precautions and Self-care to Speed Your Recovery

- Do **not** allow water to get into your ear until your doctor tells you this is OK.

Follow-up

You will need to return to the clinic often to have your hearing checked. Your doctor will tell you how often you will need to come in.

Your Follow-up Appointments:
