

Лечение препаратом Дабигатран

Прадакса

UW Medicine
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER

В этой памятке объясняется, что собой представляет лекарство под названием дабигатран, которое помогает лечить и предотвращать образование тромбов.

Что такое дабигатран?

Дабигатран (торговое наименование «Прадакса») — это *антикоагулянтный* препарат. “Анти-” означает «против», а термин “коагулянт” относится к понятию «свёртываемость крови».


Антикоагулянтный препарат помогает предотвратить образование тромбов у вас в крови.

Дабигатран иногда называют “разжижителем крови”, но на самом деле он не разжижает вашу кровь. Его действие заключается в блокировании тех компонентов вашей крови, которые обычно образует сгустки.

Почему я должен его принимать?

Ваш врач прописал вам дабигатран для лечения или предотвращения образования тромбов. У вас может быть одно из следующих состояний, способных вызвать образование тромбов:

- **Фибрилляция предсердий:** если в каком-либо участке сердца нарушается нормальный сердечный ритм (частота и последовательность сокращений сердца), внутри сердца могут образовываться сгустки крови. Фрагменты этих сгустков могут оторваться, попасть в мозг и вызвать инсульт.
- **Хирургическое вмешательство:** после операции, в том числе после операции по замене тазобедренного или коленного сустава, могут образоваться сгустки крови.
- **Тромбоз глубоких вен (ТГВ) и эмболия лёгочной артерии (ТЭЛА):** ТГВ — это сгусток крови, который образуется в вене, обычно в ногах. ТЭЛА — это сгусток, который формируется в лёгком.



Как дабигатран воздействует на организм?

Многие процессы и изменения, происходящие внутри организма, могут вызвать образование тромба. В этом процессе участвуют естественные компоненты крови, называемые факторами свёртывания.

Дабигатран блокирует один из факторов свертывания крови под названием тромбин. Дабигатран может помочь остановить образование тромбов и предотвратить их рост, однако он не разрушает уже сформировавшиеся сгустки крови.



Отсканируйте, чтобы
получить цифровую
копию этого материала.

Сколько времени требуется, чтобы дабигатран подействовал?

Дабигатран начинает снижать свёртываемость крови в течение нескольких часов после приёма первой дозы. Если вы прекратите приём дабигатрана, его влияние на свёртываемость крови у вас, как и у большинства людей, начнёт ослабевать в течение 24 часов.

Какую дозу дабигатрана мне следует принимать?

Дабигатран выпускается в капсулах по 75 мг, 110 мг и 150 мг. Ваш лечащий врач решит, какая доза подходит именно вам. Ваша доза будет зависеть от того, насколько хорошо работают ваши почки, а также от того, какие другие лекарства вы принимаете.

Ниже указаны обычные дозы для 3 наиболее распространённых состояний и заболеваний:

- **Фибрилляция предсердий:** 150 мг, 2 раза в день
- **После операции:** 110 мг, 2 раза в день
- **ТГВ и ТЭЛА:** 150 мг, 2 раза в день

Как правильно принимать дабигатран?

Капсулы дабигатрана выдаются в аптеке, запечатанными во флакон или в *блистерную упаковку*. Этот тип упаковки позволяет извлекать всего по 1 капсуле за один раз. В назначенное вам время приёма вашей дозы дабигатрана:

- Извлеките из открытого флакона или блистерной упаковки **только** ту дозу препарата, которая вам предписана. Неиспользованные капсулы необходимо защищать от воздействия на них влаги, содержащейся в воздухе.
- **Плотно закройте флакон сразу** после извлечения вашей дозы.
- **Храните дабигатран в оригинальном флаконе или блистерной упаковке. Не кладите** дабигатран в коробочку для пилюль или в таблетницу-органайзер.
- Проглотите таблетку **целиком**, запив её полным стаканом воды:
 - **Не разламывайте, не раздавливайте и не разжёвывайте капсулу.**
 - **Не вскрывайте капсулу и не высыпайте лекарство на еду или в напитки.**
 - Поговорите со своим лечащим врачом, если у вас будут проблемы с глотанием капсул.
- Вы можете принимать дабигатран с едой или натощак.
- Открывайте и используйте только один (1) флакон дабигатрана за один раз.
- После того, как вы откроете флакон, вы должны использовать лекарство в течение 4 месяцев. Если вы не закончите флакон в течение 4 месяцев, его необходимо безопасно выбросить (см. последний пункт в разделе “Как хранить дабигатран” на стр. 4). Затем вам нужно будет открыть новый флакон.
- Принимайте дабигатран точно по назначению вашего врача. Принимайте его в одно и то же время каждый день, утром и вечером.
- **Не прекращайте приём дабигатрана, если только ваш врач сам не отменит вам это лекарство.**

Как хранить дабигатран?

- Храните дабигатран в том же флаконе или блистерной упаковке, в которой вы его получили. Это защитит капсулы от воздействия влаги, содержащейся в воздухе.
- Храните флакон или блистерную упаковку при комнатной температуре. **Не** держите их на кухне или в ванной комнате.
- Плотнo закройте флакон с дабигатраном **сразу после того, как** вы извлечёте из него свою дозу.
- Храните все свои лекарства в безопасном месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Выбрасывайте неиспользованные или просроченные лекарства в мусорное ведро. Не смывайте их в унитаз и не спускайте в канализацию, за исключением того случая если вам дадут указание это сделать. Спросите своего фармацевта о том, как правильно выбрасывать неиспользованные лекарства.

Что мне делать, если я пропущу дозу?

Старайтесь не пропускать ни одной дозы дабигатрана. Если вы все-таки пропустили дозу, следуйте этим инструкциям:

- Если до вашей следующей дозы осталось **6 или более часов**, примите пропущенную дозу сразу же, как только вспомните.
- Если до вашей следующей дозы осталось **менее 6 часов**, не принимайте дополнительное лекарство, чтобы восполнить пропущенную дозу.
- **Никогда** не принимайте одновременно 2 дозы дабигатрана.

Если вы примите слишком большое количество дабигатрана, немедленно свяжитесь со своим лечащим врачом или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

Нужны ли мне рецепты с правом повторного получения лекарства?

Не допускайте того, чтобы у вас закончился запас дабигатрана. Пополняйте свой рецепт **до того**, как лекарство у вас закончится. Эффект противодействия образованию тромбов начнёт ослабевать, если вы пропустите 2 или более дозы подряд. **Это может быть очень опасно.**

Каковы побочные эффекты дабигатрана?

Незначительное кровотечение является нормальным при приёме дабигатрана. Сильное кровотечение является более серьёзной проблемой.

Незначительное кровотечение

Время от времени у вас может возникать любой из следующих симптомов:

- кровоточивость дёсен во время чистки зубов
- носовые кровотечения
- повышенная вероятность образования синяков
- более сильное, чем обычно, кровотечение при небольших порезах
- более длительное или обильное менструальное кровотечение

Сильное кровотечение

Дабигатран также может вызвать сильное кровотечение, которое способно привести к смерти (см. “Когда обращаться к врачу” ниже). **Если у вас начнётся кровотечение – для таких случаев существует лекарство, которое может нейтрализовать действие дабигатрана. Немедленно позвоните своему врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи.** Ваш врач также может лечить вас с помощью переливания крови и некоторых других методов.

Другие побочные эффекты

Другими распространёнными побочными эффектами дабигатрана являются:

- расстройство желудка
- боль в животе
- расстройство пищеварения/несварение желудка

Когда следует обращаться к врачу

При появлении любого из этих симптомов немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее отделение неотложной помощи:

- внезапная слабость в руке или ноге
- внезапное онемение или покалывание в любом месте вашего тела
- изменения в вашем зрении или потеря зрения в одном или сразу в обоих глазах
- внезапное появление невнятности речи или потеря способности говорить
- ощущение головокружения или чувство слабости, дурноты.
- появление новой боли, припухлости, покраснения или жара в руке, ноге или ступне
- появление одышки или боли в груди
- серьёзное падение или ушиб головы
- любое непрекращающееся или сильное кровотечение
- другие признаки **серьёзного кровотечения**:
 - кровотечение из глаз/кровоизлияние в глаз
 - красная или темно-коричневая моча
 - красный или черный смолистый стул
 - рвота или кашель с кровью (рвота может выглядеть как кофейная гуща)
 - сильная головная боль или боль в животе
 - синяки, которые появляются без видимой причины
 - кровотечения из носа, кровоточивость дёсен или необычное, периодически возникающее кровотечение.

Влияет ли дабигатран на действие каких-либо других лекарств?

У вас может повыситься риск кровотечения, если вы будете принимать дабигатран одновременно с другими препаратами, которые также снижают свёртываемость крови в организме.

Если вы принимаете дабигатран, **НЕ принимайте ни одно из нижеприведённых лекарств без предварительной консультации с вашим лечащим врачом или с персоналом клиники антикоагуляции:**

- Аспирин или продукты, содержащие аспирин, такие как Алка-Зельцер, Байер, Буферин, Экседрин, Найквил, Пепто- Бисмол.
- Ибупрофен (Мотрин, Адвил) и другие *нестероидные противовоспалительные препараты* (НПВП), такие как целекоксиб (Целебрекс), диклофенак (Катафлам, Вольтарен), индометацин (Индоцин), кетопрофен (Актрон, Орудис), мелоксикам (Мобик), набуметон (Релафен), напроксен (Алев, Напросин) и пироксикам (Фельден)
- Варфарин (Кумадин)
- Лекарства, содержащие гепарин
- Клопидогрел (Плавикс), прасугрел (Эффиент), тикагрелор
- (Брилинта)
- Ривароксабан (Ксарелто), апиксабан (Эликвис), эдоксабан
- (Савайса), бетриксабан (Бевикса)

Другие лекарства также могут повлиять на то, как дабигатран будет действовать на ваш организм. Вы должны сообщать своему врачу или в клинику антикоагуляции каждый раз, когда вы будете начинать или прекращать приём какого-либо лекарства. К ним относятся лекарства, которые вы покупаете без рецепта, травяные средства, витамины и минералы.

Кому я должен сообщить о том, что я принимаю дабигатран?

Сообщите **всем** своим лечащим врачам о том, что вы принимаете дабигатран. Это относится к вашим врачам, стоматологам и фармацевтам, которые выписывают вам рецепты. Если они будут знать, что вы принимаете дабигатран, то в определенных ситуациях это может повлиять на то, как они будут вас лечить.

Носите в своём бумажнике карточку, на которой написано, что вы принимаете дабигатран. Для вас также может оказаться целесообразным носить медицинский браслет или ожерелье оповещения, которые сообщат медработникам службы неотложной медицинской помощи о том, что вы принимаете дабигатран.

Могут ли возникнуть такие ситуации, в связи с которыми мне нужно будет прекратить приём дабигатрана?

- Ваш врач может посоветовать вам прекратить приём дабигатрана за 1 или более дней до медицинских или стоматологических процедур, включая хирургическое вмешательство.
- Вы **должны** прекратить приём дабигатрана перед любой процедурой, в которой используется *эпидуральный катетер*. Это – трубка, которая вводится вам в спину для обезболивания и анестезии.
- Если вам по какой-либо причине необходимо прекратить приём дабигатрана, обратитесь к врачу, который вам его прописал. Выясните, когда вам следует прекратить его приём. Этот врач также скажет вам, когда вам следует возобновить приём дабигатрана после вашей операции или процедуры.



Не забудьте поставить в известность всех своих лечащих врачей о том, что вы принимаете дабигатран. Если по какой-либо причине вам необходимо прекратить приём дабигатрана, сообщите об этом врачу, который вам его назначил.

Вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу приёма дабигатрана

Вопрос: *Нужно ли мне регулярно сдавать анализы крови?*

Ответ: Вам **не** нужно регулярно сдавать анализ крови, чтобы проверять количество дабигатрана в вашем организме. Однако ваша доза дабигатрана будет зависеть от того, насколько хорошо будут работать ваши почки. В связи с этим ваш врач может время от времени назначать вам анализ крови, чтобы проверять состояние ваших почек. Вам также может потребоваться ежегодный общий анализ крови и анализ функции печени.

Вопрос: *Могу ли я употреблять алкоголь?*

Ответ: **Лучше всего избегать употребления алкоголя во время приёма дабигатрана.** Алкоголь может увеличить риск кровотечения в желудке и кишечнике.

Если вы употребляете алкоголь, не пейте больше 1 порции в день. Если вы употребляете алкоголь лишь иногда, не пейте больше 2 порций за один раз. Одна порция = или 1 стакан пива, или 1 бокал вина, или 1 коктейль, или 1 рюмка.

Вопрос: Должен ли я ограничить физическую активность?

Ответ: Поскольку дабигатран увеличивает риск кровотечения:


- Расскажите своему лечащему врачу, фармацевту клиники антикоагуляции или медсестре, какие физические нагрузки вы испытываете в настоящее время. Они скажут вам, безопасно ли продолжать делать это во время приёма дабигатрана.
- Избегайте действий, которые могут привести к травме. Обычно безопасно гулять, бегать трусцой, плавать и работать в саду.

Вопрос: Что, если я заболею?

Ответ: Обратитесь к своему врачу или в клинику антикоагуляции, если вы заболели и не можете принимать дабигатран. См. раздел “Что мне делать, если я пропущу дозу?” на стр. 4.

Вопрос: Могу ли я принимать дабигатран, если я беременна?

Ответ: Мы не знаем, как дабигатран влияет на беременность или нерождённых детей. Если вы забеременели или планируете забеременеть во время приёма дабигатрана, **немедленно** позвоните своему врачу, чтобы обсудить с ним вопрос о том, какова польза от приёма дабигатрана и насколько опасны связанные с ним риски во время беременности.



Звоните своему лечащему врачу или в клинику антикоагуляции каждый раз, когда вы будете начинать или прекращать приём любых лекарственных препаратов – прописанных врачом, безрецептурных, травяных средств или витаминных добавок.

Лекарственное взаимодействие с дабигатраном может увеличить у вас риск кровотечения.

Есть вопросы?

Ваши вопросы очень важны. Позвоните вашему врачу или медицинскому работнику, если у вас есть вопросы или проблемы.

Телефоны клиник антикоагуляции:

- **Медцентр UWMC - Montlake:** 206.598.4874
- **Медцентр UWMC - Northwest:** 206.668.1282
- **Медцентр Harborview:** 206.744.2976

В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни звоните по телефону 206.598.6190 и попросите вызвать дежурного фармацевта клиники антикоагуляции.

Treatment with Dabigatran

Pradaxa

This handout explains the medicine dabigatran, a drug that helps prevent and treat blood clots.

What is dabigatran?


Dabigatran (brand name Pradaxa) is an *anticoagulant* medicine. “Anti” means against, and “coagulant” refers to blood clotting. An anticoagulant helps prevent clots from forming in your blood.

Sometimes dabigatran is called a “blood thinner,” but it does not really thin your blood. It works by keeping a natural part of your blood from forming clots.

Why am I taking it?

Your doctor has prescribed dabigatran to treat or prevent blood clots. You may have one of these conditions that can cause clots:

- **Atrial fibrillation:** If part of the heart does not beat the way it should, blood clots can form within the heart. Parts of these clots can break off, travel to the brain, and cause a stroke.
- **Surgery:** Blood clots may form after surgery, including surgery to replace a hip or knee.
- **Deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE):** A DVT is a blood clot that forms in a vein, usually in the legs. A PE is a clot that is in the lung.



A blood clot inside a vein.

How does dabigatran work?

Many things must happen inside the body for a blood clot to form. Natural parts of the blood called *clotting factors* are involved in this process.

Dabigatran blocks one of these clotting factors, called *thrombin*. Dabigatran can help stop clots from forming and can keep clots from getting larger, but it does not break up clots that already exist.

How long does dabigatran take to work?

Dabigatran begins to reduce blood clotting within a few hours after you take the first dose. If you stop taking dabigatran, its effects on clotting begin to wear off within 24 hours for most people.



Scan for a digital
copy of this
handout.

How much dabigatran should I take?

Dabigatran comes in 75 mg, 110 mg, and 150 mg tablets. Your doctor will decide which dose is right for you. Your dose will depend on how well your kidneys are working, and other medicines you take. These are the usual doses for the 3 common conditions:

- **Atrial fibrillation:** 150 mg, 2 times a day
- **After surgery:** 110 mg, 2 times a day
- **DVT and PE:** 150 mg, 2 times a day

How should I take dabigatran?

Dabigatran capsules come in a bottle or in a *blister package*. This type of packaging allows you to remove just 1 capsule at a time. When it is time to take your dose of dabigatran:

- Remove **only** your prescribed dose from your open bottle or blister package. Unused pills must be protected from moisture in the air.
- **Tightly close the bottle right away** after removing your dose.
- **Keep dabigatran in the original bottle or blister package.** Do not put dabigatran in pillboxes or pill organizers.
- Swallow dabigatran **whole** with a full glass of water:
 - **Do not break, crush or chew the capsule.**
 - Do **not** open the capsule to sprinkle the medicine on food or into drinks.
 - Talk with your doctor if you have trouble swallowing capsules.
- You can take dabigatran with or without food.
- Open and use only 1 bottle of dabigatran at a time.
- After you open a bottle, you must use the medicine within 4 months. If you do not finish the bottle within 4 months, it must be safely thrown away (see the last bullet under “How do I store dabigatran” on page 2). Then you need to start a new bottle.
- Take dabigatran exactly as prescribed by your doctor. Take it at the same time each day, in the morning and at night.
- Do **not** stop taking dabigatran unless your doctor tells you to.

How do I store dabigatran?

- Keep dabigatran in the bottle or blister package it came in. This protects the capsules from moisture in the air.
- Store the bottle or blister package at room temperature. Do **not** keep it in the kitchen or bathroom.
- Tightly close the bottle of dabigatran **right away** after you take your dose.
- Keep all medicines in a safe place, out of the reach of children and pets.
- Put unused or expired medicines in the trash. Do **not** flush them down a toilet or pour them down a drain, unless you are told to do so. Ask your pharmacist about the best way to throw away extra medicines.

What should I do if I miss a dose?

Try not to miss any doses of dabigatran. If you do miss a dose:

- If your next dose is **6 or more hours away**, take the missed dose as soon as you remember.
- If your next dose is **less than 6 hours away**, skip the missed dose.
- **Never** take 2 doses of dabigatran at the same time.

If you take too much dabigatran, call your doctor right away or go to the nearest emergency room.

Do I need refills?

Do **not** run out of dabigatran. Refill your prescription **before** you run out. The clot-fighting effects begin to wear off if you miss 2 or more doses in a row. **This can be very dangerous.**

What are the side effects of dabigatran?

Light bleeding is normal with dabigatran. Heavy bleeding is more serious.

Light Bleeding

You may have any of these symptoms from time to time:

- Gums bleeding when you brush your teeth
- Nosebleeds
- Easy bruising
- More bleeding than normal from small cuts
- Longer or heavier menstrual bleeding

Heavy Bleeding

Dabigatran can also cause severe bleeding that could lead to death (see “When to Call Your Doctor” below). **If you start to bleed, there is a medicine that can reverse the effects of dabigatran. Call your doctor or go to the emergency room right away.** Your doctor may also treat you with blood transfusions and other methods.

Other Side Effects

Other common side effects of dabigatran are:

- Stomach upset
- Belly pain
- Indigestion

When to Call Your Doctor

Call your doctor or go to the nearest emergency room right away if you have:

- Sudden weakness in an arm or leg
- Sudden numbness or tingling anywhere in your body
- Changes in eyesight or not being able to see out of one or both eyes
- Suddenly having slurred speech or not being able to speak
- Dizziness or faintness
- New pain, swelling, redness, or heat in your arm, leg, or foot
- New shortness of breath or chest pain
- A serious fall or hit your head
- Any bleeding that does not stop or is very heavy
- Signs of **serious bleeding**:
 - Bleeding in your eyes
 - Red or dark brown urine
 - Red or black tarry stool
 - Vomiting or coughing up blood (vomit may look like coffee grounds)
 - Severe headache or stomachache
 - Bruises that appear for no known reason
 - Nosebleeds, bleeding gums, or unusual bleeding that keeps happening

Does dabigatran affect how any other medicines work?

You may have a higher risk of bleeding if you take dabigatran and other medicines that also lower your blood's ability to form clots. If you are taking dabigatran, **do NOT take any of these medicines without first checking with your doctor or anticoagulation clinic:**

- Aspirin or products that contain aspirin, such as Alka-Seltzer, Bayer, Bufferin, Excedrin, Nyquil, and Pepto-Bismol
- Ibuprofen (Motrin, Advil) and other *non-steroidal anti-inflammatory drugs* (NSAIDs) such as celecoxib (Celebrex), diclofenac (Cataflam, Voltaren), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Actron, Orudis), meloxicam (Mobic), nabumetone (Relafen), naproxen (Aleve, Naprosyn, and others), and piroxicam (Feldene)
- Warfarin (Coumadin)
- Medicines that contain heparin
- Clopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient), ticagrelor (Brilinta)
- Rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), edoxaban (Savaysa), betrixaban (Bevyxxa)

Other drugs may also affect how dabigatran works in your body. You must tell your doctor or anticoagulation clinic whenever you start or stop any medicine. This includes medicines you buy without a prescription, herbal products, and vitamins.

Who should I tell I am taking dabigatran?

Tell **all** your healthcare providers that you are taking dabigatran. This includes your doctors, dentist, and all pharmacists where you have prescriptions filled. Being on dabigatran may affect how they care for you in certain medical situations.

Carry a wallet card that says you take dabigatran. You may also want to wear a medical alert bracelet or necklace that will tell emergency health care providers that you take dabigatran.

Are there any times I should stop taking dabigatran?

- Your doctor may tell you to stop taking dabigatran for 1 or more days before medical or dental procedures, including surgery.
- You **must** stop taking dabigatran before any procedure that uses an *epidural catheter*. This is a tube that is placed in your back for pain medicine and anesthesia.
- If you need to stop taking dabigatran for any reason, call the doctor who prescribed it for you. Find out when you should stop taking it. This doctor will also tell you when to start taking dabigatran again after your surgery or procedure.



Remember to tell all your healthcare providers that you are taking dabigatran. If you must stop dabigatran for any reason, tell the doctor who prescribed dabigatran for you.

Questions You May Have While Taking Dabigatran

Q. Do I need to have regular blood tests?

You do **not** need to have routine blood testing to check the amount of dabigatran in your body. But the dose of dabigatran is based on how well your kidneys are working. Because of this, your doctor may want you to have a blood test from time to time to check the health of your kidneys. You may also need yearly blood counts and liver function tests.

Q. Can I drink alcohol?

It is best to avoid alcohol while taking dabigatran. Alcohol can increase the risk of bleeding in your stomach and intestines.

If you do drink alcohol, do not have more than 1 drink a day, and no more than 2 drinks at a time every now and then. One drink = 1 beer, **or** 1 glass of wine, **or** 1 cocktail, **or** 1 shot.

Q. Should I limit activities?

Since dabigatran increases your risk of bleeding:


- Avoid activities that could cause an injury. It is usually safe to walk, jog, swim, and work in the garden.
- Tell your doctor or anticoagulation clinic pharmacist or nurse what your current activities are. They will tell you if it is safe to keep doing these while taking dabigatran.

Q. What if I get sick?

Call your doctor or anticoagulation clinic if you get sick and cannot take your dabigatran. See “What should I do if I miss a dose?” on page 3.

Q. Can I take dabigatran if I am pregnant?

We do not know how dabigatran affects pregnancy or unborn babies. If you become pregnant or plan to become pregnant while taking dabigatran, call your doctor **right away** to talk about the benefits and risks of taking dabigatran while you are pregnant.



Call your doctor or the anticoagulation clinic whenever you start or stop any prescription or over-the-counter medicine, herbal product, or vitamin supplement.

Drug interactions with dabigatran can increase your risk of bleeding.

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or healthcare provider if you have questions or concerns.

Anticoagulation Clinics:

- **UWMC – Montlake:** 206.598.4874
- **UWMC – Northwest:** 206.668.1282
- **Harborview Medical Center:** 206.744.2976

After hours and on weekends and holidays, call 206.598.6190 and ask for the Anticoagulation Clinic pharmacist on call to be paged.