

Khi Bác Sĩ Của Bạn Kê Toa Thuốc Kháng Sinh

Bạn nên biết gì

Tài liệu này giải thích thuốc kháng sinh là gì, tại sao dùng và những tác dụng phụ có thể xảy ra.

Thuốc kháng sinh là gì?

Thuốc kháng sinh là một loại thuốc. Thuốc này được dùng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng. Thuốc này cũng có thể được dùng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thuốc kháng sinh có thể cứu mạng sống. Nhưng chúng là loại thuốc mạnh và chỉ nên dùng khi cần. Chúng cũng phải được dùng chính xác theo chỉ định của bác sĩ.

Tại sao tôi cần thuốc kháng sinh?

Nhóm chăm sóc của bạn nghĩ rằng bạn có thể:

- Bị nhiễm trùng hoặc
- Nguy cơ bị nhiễm trùng

Tôi cần biết thêm gì?

- Chúng tôi có thể xét nghiệm trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc kháng sinh. Các thử nghiệm này sẽ giúp chúng tôi biết loại thuốc kháng sinh nào sẽ có hiệu quả tốt nhất cho bạn.
- Chúng tôi có thể tiến hành thêm nhiều xét nghiệm trong khi bạn đang dùng thuốc. Các xét nghiệm này sẽ giúp chúng tôi theo dõi bất kỳ tác dụng phụ nào. Dựa trên kết quả xét nghiệm của bạn, bác sĩ có thể:
 - **Thay đổi** thuốc kháng sinh của bạn
 - **Ngừng** dùng thuốc kháng sinh nếu không còn cần dùng nữa
- Quan trọng: Bạn phải dùng hết thuốc kháng sinh theo đúng bác sĩ chỉ định.

Có tác dụng phụ không?


Thuốc kháng sinh của bạn có thể gây ra tác dụng phụ. Một số triệu chứng có thể nhẹ, nhưng một số khác có thể nghiêm trọng hơn.

Uống thuốc kháng sinh làm tăng nguy cơ có hai vấn đề nghiêm trọng: Nhiễm trùng *Clostridium difficile* và nhiễm trùng *chống lại thuốc kháng sinh*.

UW Medicine
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER



Dùng máy ảnh điện thoại của bạn chụp mã để nhận bản sao tài liệu phát tay này.




Khi bạn đang ở trong bệnh viện, bạn có thể nhận thuốc kháng sinh qua đường tĩnh mạch (IV).

Nhiễm trùng *Clostridium difficile*

Clostridium difficile (C. diff) là một loại vi khuẩn. Khi bạn dùng thuốc kháng sinh, một số vi trùng tốt trong ruột của bạn bị tiêu diệt. Điều này cho phép vi khuẩn C. diff phát triển.

Tiêu chảy là một dấu hiệu của nhiễm trùng C. diff. Hãy báo **ngay** cho nhóm chăm sóc nếu bạn mới bị tiêu chảy:

- Trong khi bạn đang dùng thuốc kháng sinh, hoặc
- Trong vòng vài tuần sau khi ngừng dùng thuốc kháng sinh



Quan trọng: Bạn phải dùng hết thuốc kháng sinh theo đúng bác sĩ chỉ định.

Nhiễm Trùng Chống Lại Thuốc Kháng Sinh

Loại nhiễm trùng này rất khó điều trị bằng thuốc kháng sinh. Dùng thuốc kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh nhiễm trùng này trong tương lai. Nhóm chăm sóc của bạn sẽ theo dõi bạn để biết bất kỳ dấu hiệu nào chống lại thuốc kháng sinh.

Để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng chống lại thuốc kháng sinh:

- Chỉ dùng thuốc kháng sinh khi cần, theo chỉ định của bác sĩ.
- Nếu bác sĩ cho toa thuốc kháng sinh, hãy uống hết thuốc theo chỉ dẫn.

Câu Hỏi hoặc Bạn Tâm

Câu hỏi của bạn rất quan trọng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại tác dụng phụ có thể xảy ra, vui lòng nói chuyện với nhóm chăm sóc của bạn.